

表 291 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(福岡県)

| 死因 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|-----------|------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 心不全 | 103 (%) | 91 (21.5) | 194 (17.1) | | 194 (17.1) |
| 脳血管障害 | 36 (%) | 25 (5.9) | 61 (5.4) | | 61 (5.4) |
| 感染症 | 201 (%) | 108 (25.5) | 309 (27.2) | | 309 (27.2) |
| 消化管出血 | 12 (%) | 6 (1.4) | 18 (1.6) | | 18 (1.6) |
| 悪性腫瘍 | 111 (%) | 29 (6.9) | 140 (12.3) | | 140 (12.3) |
| 悪液質/尿毒症 | 17 (%) | 12 (2.8) | 29 (2.6) | | 29 (2.6) |
| 心筋梗塞 | 41 (%) | 16 (3.8) | 57 (5.0) | | 57 (5.0) |
| カリウム中毒/頓死 | 16 (%) | 8 (1.9) | 24 (2.1) | | 24 (2.1) |
| 肝硬変症 | 12 (%) | 3 (0.7) | 15 (1.3) | | 15 (1.3) |
| 自殺/拒否 | 3 (%) | 2 (0.5) | 5 (0.4) | | 5 (0.4) |
| 腸閉塞 | 10 (%) | 6 (1.4) | 16 (1.4) | | 16 (1.4) |
| 肺血栓/肺塞栓 | | 3 (0.7) | 3 (0.3) | | 3 (0.3) |
| 災害・事故死 | 5 (%) | 3 (0.7) | 8 (0.7) | | 8 (0.7) |
| その他 | 68 (%) | 75 (17.7) | 143 (12.6) | | 143 (12.6) |
| 不明 | 77 (%) | 36 (8.5) | 113 (10.0) | | 113 (10.0) |
| 合計 | 712 (%) | 423 (100.0) | 1,135 (100.0) | | 1,135 (100.0) |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 712 | 423 | 1,135 | | 1,135 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査