

表 292 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(佐賀県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	33	24	57		57
(%)	(22.4)	(37.5)	(27.0)		(27.0)
脳血管障害	10	6	16		16
(%)	(6.8)	(9.4)	(7.6)		(7.6)
感染症	33	9	42		42
(%)	(22.4)	(14.1)	(19.9)		(19.9)
消化管出血	1	1	2		2
(%)	(0.7)	(1.6)	(0.9)		(0.9)
悪性腫瘍	26	2	28		28
(%)	(17.7)	(3.1)	(13.3)		(13.3)
悪液質/尿毒症	7	6	13		13
(%)	(4.8)	(9.4)	(6.2)		(6.2)
心筋梗塞	6	3	9		9
(%)	(4.1)	(4.7)	(4.3)		(4.3)
カリウム中毒/頓死					
(%)					
肝硬変症	4		4		4
(%)	(2.7)		(1.9)		(1.9)
自殺/拒否	4	1	5		5
(%)	(2.7)	(1.6)	(2.4)		(2.4)
腸閉塞	1		1		1
(%)	(0.7)		(0.5)		(0.5)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	2		2		2
(%)	(1.4)		(0.9)		(0.9)
その他	12	9	21		21
(%)	(8.2)	(14.1)	(10.0)		(10.0)
不明	8	3	11		11
(%)	(5.4)	(4.7)	(5.2)		(5.2)
合計	147	64	211		211
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	147	64	211		211

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査