

表 293 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(長崎県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	46	43	89		89
(%)	(20.9)	(28.3)	(23.9)		(23.9)
脳血管障害	12	15	27		27
(%)	(5.5)	(9.9)	(7.3)		(7.3)
感染症	60	30	90		90
(%)	(27.3)	(19.7)	(24.2)		(24.2)
消化管出血	3	2	5		5
(%)	(1.4)	(1.3)	(1.3)		(1.3)
悪性腫瘍	21	6	27		27
(%)	(9.5)	(3.9)	(7.3)		(7.3)
悪液質/尿毒症	12	5	17		17
(%)	(5.5)	(3.3)	(4.6)		(4.6)
心筋梗塞	14	3	17		17
(%)	(6.4)	(2.0)	(4.6)		(4.6)
カリウム中毒/頓死	7	5	12		12
(%)	(3.2)	(3.3)	(3.2)		(3.2)
肝硬変症	4	2	6		6
(%)	(1.8)	(1.3)	(1.6)		(1.6)
自殺/拒否					
(%)					
腸閉塞	3	3	6		6
(%)	(1.4)	(2.0)	(1.6)		(1.6)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.3)		(0.3)
災害・事故死	3	2	5		5
(%)	(1.4)	(1.3)	(1.3)		(1.3)
その他	21	18	39		39
(%)	(9.5)	(11.8)	(10.5)		(10.5)
不明	13	18	31		31
(%)	(5.9)	(11.8)	(8.3)		(8.3)
合計	220	152	372		372
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	220	152	372		372

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査