

表 294 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(熊本県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	99	61	160		160
(%)	(29.3)	(29.2)	(29.3)		(29.3)
脳血管障害	22	13	35		35
(%)	(6.5)	(6.2)	(6.4)		(6.4)
感染症	71	58	129		129
(%)	(21.0)	(27.8)	(23.6)		(23.6)
消化管出血	9	2	11		11
(%)	(2.7)	(1.0)	(2.0)		(2.0)
悪性腫瘍	36	15	51		51
(%)	(10.7)	(7.2)	(9.3)		(9.3)
悪液質/尿毒症	7	6	13		13
(%)	(2.1)	(2.9)	(2.4)		(2.4)
心筋梗塞	8	2	10		10
(%)	(2.4)	(1.0)	(1.8)		(1.8)
カリウム中毒/頓死	10	4	14		14
(%)	(3.0)	(1.9)	(2.6)		(2.6)
肝硬変症	3	2	5		5
(%)	(0.9)	(1.0)	(0.9)		(0.9)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
腸閉塞	1	2	3		3
(%)	(0.3)	(1.0)	(0.5)		(0.5)
肺血栓/肺塞栓	2		2		2
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
災害・事故死	3	1	4		4
(%)	(0.9)	(0.5)	(0.7)		(0.7)
その他	28	18	46		46
(%)	(8.3)	(8.6)	(8.4)		(8.4)
不明	37	25	62		62
(%)	(10.9)	(12.0)	(11.3)		(11.3)
合計	338	209	547		547
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	338	209	547		547

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査