

表 296 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(宮崎県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	55	38	93		93
(%)	(24.1)	(30.9)	(26.5)		(26.5)
脳血管障害	20	13	33		33
(%)	(8.8)	(10.6)	(9.4)		(9.4)
感染症	48	21	69		69
(%)	(21.1)	(17.1)	(19.7)		(19.7)
消化管出血	4	3	7		7
(%)	(1.8)	(2.4)	(2.0)		(2.0)
悪性腫瘍	23	6	29		29
(%)	(10.1)	(4.9)	(8.3)		(8.3)
悪液質/尿毒症	13	8	21		21
(%)	(5.7)	(6.5)	(6.0)		(6.0)
心筋梗塞	16	5	21		21
(%)	(7.0)	(4.1)	(6.0)		(6.0)
カリウム中毒/頓死	10	2	12		12
(%)	(4.4)	(1.6)	(3.4)		(3.4)
肝硬変症					
(%)					
自殺/拒否	4	1	5		5
(%)	(1.8)	(0.8)	(1.4)		(1.4)
腸閉塞	5	1	6		6
(%)	(2.2)	(0.8)	(1.7)		(1.7)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.4)	(0.8)	(0.6)		(0.6)
災害・事故死					
(%)					
その他	16	12	28		28
(%)	(7.0)	(9.8)	(8.0)		(8.0)
不明	13	12	25		25
(%)	(5.7)	(9.8)	(7.1)		(7.1)
合計	228	123	351		351
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	228	123	351		351

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査