

表 297 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(鹿児島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	95	71	166		166
(%)	(25.0)	(29.1)	(26.6)		(26.6)
脳血管障害	27	20	47		47
(%)	(7.1)	(8.2)	(7.5)		(7.5)
感染症	78	33	111		111
(%)	(20.5)	(13.5)	(17.8)		(17.8)
消化管出血	8	4	12		12
(%)	(2.1)	(1.6)	(1.9)		(1.9)
悪性腫瘍	39	21	60		60
(%)	(10.3)	(8.6)	(9.6)		(9.6)
悪液質/尿毒症	24	30	54		54
(%)	(6.3)	(12.3)	(8.7)		(8.7)
心筋梗塞	17	12	29		29
(%)	(4.5)	(4.9)	(4.6)		(4.6)
カリウム中毒/頓死	8	8	16		16
(%)	(2.1)	(3.3)	(2.6)		(2.6)
肝硬変症	5		5		5
(%)	(1.3)		(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	4	1	5		5
(%)	(1.1)	(0.4)	(0.8)		(0.8)
腸閉塞	2	4	6		6
(%)	(0.5)	(1.6)	(1.0)		(1.0)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	4	1	5		5
(%)	(1.1)	(0.4)	(0.8)		(0.8)
その他	38	27	65		65
(%)	(10.0)	(11.1)	(10.4)		(10.4)
不明	31	12	43		43
(%)	(8.2)	(4.9)	(6.9)		(6.9)
合計	380	244	624		624
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	380	244	624		624

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査