

表 303 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝慢性腎盂腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)												1 (10.0)	4 (25.0)	6 (26.1)	4 (11.8)	5 (12.5)	8 (14.0)	14 (34.1)	3 (25.0)		45 (18.5)			45 (18.5)	78.62	9.80
脳血管障害 (%)								1 (100.0)				2 (20.0)	3 (18.8)	4 (17.4)	2 (5.9)	2 (5.0)	3 (5.3)	3 (7.3)	1 (8.3)		21 (8.6)			21 (8.6)	71.38	12.91
感染症 (%)												2 (20.0)	2 (12.5)	4 (17.4)	9 (26.5)	10 (25.0)	15 (26.3)	6 (14.6)	2 (16.7)	3 (100.0)	53 (21.8)			53 (21.8)	78.49	8.92
消化管出血 (%)															2 (5.9)	1 (2.5)		1 (2.4)			4 (1.6)			4 (1.6)	77.25	7.54
悪性腫瘍 (%)									1 (100.0)	1 (33.3)	2 (100.0)	1 (10.0)		1 (4.3)	6 (17.6)	3 (7.5)	6 (10.5)	3 (7.3)			24 (9.9)			24 (9.9)	72.33	13.43
悪液質/尿毒症 (%)													1 (6.3)	1 (4.3)			3 (5.3)				5 (2.1)			5 (2.1)	75.20	10.38
心筋梗塞 (%)										1 (33.3)			1 (6.3)		1 (2.9)	4 (10.0)	4 (7.0)	2 (4.9)			13 (5.3)			13 (5.3)	76.46	11.16
カリウム中毒/頓死 (%)												1 (10.0)			2 (5.9)		1 (1.8)				4 (1.6)			4 (1.6)	70.50	11.68
肝硬変症 (%)																	1 (1.8)				1 (0.4)			1 (0.4)	83.00	
自殺/拒否 (%)															1 (2.9)						1 (0.4)			1 (0.4)	73.00	
腸閉塞 (%)																1 (2.5)	1 (1.8)				2 (0.8)			2 (0.8)	81.50	3.54
肺血栓/肺塞栓 (%)																		1 (2.4)			1 (0.4)			1 (0.4)	85.00	
災害・事故死 (%)													1 (6.3)					1 (2.4)			2 (0.8)			2 (0.8)	74.00	18.38
その他 (%)										1 (33.3)		1 (10.0)	2 (12.5)	2 (8.7)	2 (5.9)	7 (17.5)	8 (14.0)	7 (17.1)	4 (33.3)		34 (14.0)			34 (14.0)	78.82	11.07
不明 (%)												2 (20.0)	2 (12.5)	5 (21.7)	5 (14.7)	7 (17.5)	7 (12.3)	3 (7.3)	2 (16.7)		33 (13.6)			33 (13.6)	75.88	9.66
合計 (%)								1 (100.0)	1 (100.0)	3 (100.0)	2 (100.0)	10 (100.0)	16 (100.0)	23 (100.0)	34 (100.0)	40 (100.0)	57 (100.0)	41 (100.0)	12 (100.0)	3 (100.0)	243 (100.0)			243 (100.0)	76.67	10.69
記載なし																										
総計								1	1	3	2	10	16	23	34	40	57	41	12	3	243			243	76.67	10.69

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査