

表 306 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患=その他分類不能の腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)										1 (50.0)	1 (25.0)			1 (12.5)		5 (23.8)	4 (22.2)		1 (16.7)		13 (15.9)			13 (15.9)	75.31	12.66
脳血管障害 (%)												1 (100.0)	2 (25.0)		1 (14.3)	1 (4.8)	1 (5.6)	1 (16.7)			7 (8.5)			7 (8.5)	71.57	10.49
感染症 (%)								1 (50.0)		1 (25.0)			2 (25.0)	1 (12.5)	2 (28.6)	2 (9.5)	6 (33.3)	2 (33.3)	1 (16.7)		18 (22.0)			18 (22.0)	74.78	12.11
消化管出血 (%)																2 (9.5)		2 (33.3)			4 (4.9)			4 (4.9)	82.25	5.74
悪性腫瘍 (%)													2 (25.0)	1 (14.3)	2 (9.5)	2 (11.1)	2 (5.6)	2 (16.7)			7 (8.5)			7 (8.5)	74.14	6.44
悪液質/尿毒症 (%)																1 (4.8)	1 (5.6)		1 (16.7)		3 (3.7)			3 (3.7)	84.33	7.57
心筋梗塞 (%)													1 (12.5)	1 (12.5)	2 (28.6)						4 (4.9)			4 (4.9)	69.25	4.50
カリウム中毒/頓死 (%)											1 (25.0)		1 (12.5)			1 (4.8)					3 (3.7)			3 (3.7)	65.00	13.53
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																	1 (5.6)	1 (16.7)			2 (2.4)			2 (2.4)	85.00	1.41
腸閉塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)								1 (100.0)			1 (25.0)			2 (25.0)		4 (19.0)	3 (16.7)		1 (16.7)		12 (14.6)			12 (14.6)	72.67	15.03
不明 (%)													2 (25.0)	1 (12.5)	1 (14.3)	3 (14.3)			2 (33.3)		9 (11.0)			9 (11.0)	74.67	10.38
合計 (%)								1 (100.0)		2 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)	7 (100.0)	21 (100.0)	18 (100.0)	6 (100.0)	6 (100.0)		82 (100.0)			82 (100.0)	74.55	11.42
記載なし																										
総計								1		2	4	1	8	8	7	21	18	6	6		82			82	74.55	11.42

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。  
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
 2014年調査