

表 311 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患=SLE腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)									1 (20.0)		3 (27.3)	2 (11.8)	6 (21.4)	7 (26.9)	8 (18.6)	9 (25.7)	10 (38.5)	4 (23.5)	2 (40.0)	1 (50.0)	53 (24.1)	1 (100.0)		54 (24.4)	73.17	11.20
脳血管障害 (%)													1 (3.6)	1 (3.8)		2 (5.7)	2 (7.7)	1 (5.9)			7 (3.2)			7 (3.2)	75.57	8.08
感染症 (%)							1 (100.0)	2 (66.7)	1 (20.0)		4 (36.4)	5 (29.4)	8 (28.6)	5 (19.2)	14 (32.6)	8 (22.9)	4 (15.4)	4 (23.5)	2 (40.0)		58 (26.4)			58 (26.2)	68.47	13.50
消化管出血 (%)										1 (100.0)	1 (9.1)	1 (5.9)	1 (3.6)	1 (3.8)	1 (2.3)		1 (3.8)				7 (3.2)			7 (3.2)	62.14	12.76
悪性腫瘍 (%)									1 (20.0)		1 (9.1)	2 (11.8)	2 (7.1)	2 (7.7)	4 (9.3)		1 (3.8)				13 (5.9)			13 (5.9)	64.62	10.70
悪液質/尿毒症 (%)													1 (3.6)		3 (7.0)	1 (2.9)	3 (11.5)	3 (17.6)			11 (5.0)			11 (5.0)	78.36	7.86
心筋梗塞 (%)									1 (20.0)				2 (7.1)	1 (3.8)	4 (9.3)	1 (2.9)					9 (4.1)			9 (4.1)	67.00	11.37
カリウム中毒/頓死 (%)									1 (20.0)			1 (5.9)		1 (3.8)	1 (2.3)	2 (5.7)	1 (3.8)				7 (3.2)			7 (3.2)	67.43	14.32
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)								1 (33.3)							1 (2.3)		1 (3.8)				3 (1.4)			3 (1.4)	62.67	23.44
腸閉塞 (%)													1 (3.6)		1 (2.3)	1 (2.9)					3 (1.4)			3 (1.4)	71.00	6.24
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)											1 (9.1)	3 (17.6)	3 (10.7)	4 (15.4)	3 (7.0)	7 (20.0)	1 (3.8)	2 (11.8)	1 (20.0)	1 (50.0)	26 (11.8)			26 (11.8)	72.42	11.15
不明 (%)											1 (9.1)	3 (17.6)	3 (10.7)	4 (15.4)	3 (7.0)	4 (11.4)	2 (7.7)	3 (17.6)			23 (10.5)			23 (10.4)	70.70	10.65
合計 (%)							1 (100.0)	3 (100.0)	5 (100.0)	1 (100.0)	11 (100.0)	17 (100.0)	28 (100.0)	26 (100.0)	43 (100.0)	35 (100.0)	26 (100.0)	17 (100.0)	5 (100.0)	2 (100.0)	220 (100.0)	1 (100.0)		221 (100.0)	70.45	12.13
記載なし																										
総計							1	3	5	1	11	17	28	26	43	35	26	17	5	2	220	1		221	70.45	12.13

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。  
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
 2014年調査