

表 315 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=腎・尿路結核

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
心不全 (%)														1 (16.7)	1 (25.0)	2 (20.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	6 (21.4)			6 (21.4)			6 (21.4)	80.67	9.73
脳血管障害 (%)														2 (33.3)	2 (20.0)	2 (66.7)			6 (21.4)			6 (21.4)			6 (21.4)	79.67	8.82
感染症 (%)														1 (16.7)	1 (25.0)	1 (10.0)			2 (7.1)			2 (7.1)			2 (7.1)	74.00	9.90
消化管出血 (%)														1 (16.7)	1 (25.0)	1 (10.0)			2 (7.1)			2 (7.1)			2 (7.1)	78.00	8.49
悪性腫瘍 (%)														1 (25.0)	1 (10.0)	1 (33.3)			1 (3.6)			1 (3.6)			1 (3.6)	94.00	
悪液質/尿毒症 (%)														1 (50.0)	1 (10.0)	1 (33.3)			1 (3.6)			1 (3.6)			1 (3.6)	(3.6)	
心筋梗塞 (%)																		1 (3.6)			1 (3.6)			1 (3.6)	83.00		
カリウム中毒/頓死 (%)																		1 (3.6)			1 (3.6)			1 (3.6)	76.00		
肝硬変症 (%)																											
自殺/拒否 (%)																											
腸閉塞 (%)																											
肺血栓/肺塞栓 (%)																											
災害・事故死 (%)														1 (16.7)	1 (25.0)	2 (20.0)			1 (3.6)			1 (3.6)			1 (3.6)	69.00	
その他 (%)														1 (16.7)	1 (25.0)	1 (10.0)			4 (14.3)			4 (14.3)			4 (14.3)	75.00	8.41
不明 (%)														1 (25.0)	1 (50.0)	1 (10.0)			4 (14.3)			4 (14.3)			4 (14.3)	80.25	7.68
合計 (%)														6 (100.0)	4 (100.0)	2 (100.0)	10 (100.0)	3 (100.0)	28 (100.0)			28 (100.0)			28 (100.0)	78.89	8.42
記載なし																											
総計														6	4	2	10	3	3	28			28	78.89	8.42		

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査