

表 317 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患=腎・尿路腫瘍

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)															1 (5.3)	3 (9.7)	6 (15.8)	10 (47.6)	2 (25.0)		22 (15.2)			22 (15.2)	83.68	4.71
脳血管障害 (%)															2 (10.5)	3 (9.7)	2 (5.3)	1 (4.8)			8 (5.5)			8 (5.5)	77.50	5.48
感染症 (%)								1 (33.3)					1 (20.0)	1 (10.0)	4 (21.1)	3 (9.7)	5 (13.2)	1 (4.8)	1 (12.5)		17 (11.7)			17 (11.7)	75.12	11.34
消化管出血 (%)																		1 (4.8)			1 (0.7)			1 (0.7)	89.00	
悪性腫瘍 (%)								1 (50.0)	2 (66.7)	2 (100.0)	1 (100.0)	1 (50.0)	2 (40.0)	8 (80.0)	10 (52.6)	13 (41.9)	14 (36.8)	5 (23.8)	2 (25.0)		61 (42.1)			61 (42.1)	73.28	12.04
悪液質/尿毒症 (%)														1 (10.0)	2 (10.5)	1 (3.2)	1 (2.6)			1 (33.3)	6 (4.1)			6 (4.1)	78.33	10.54
心筋梗塞 (%)													1 (20.0)			1 (3.2)					2 (1.4)			2 (1.4)	70.00	9.90
カリウム中毒/頓死 (%)												1 (50.0)				1 (3.2)	1 (2.6)			1 (12.5)	4 (2.8)			4 (2.8)	76.75	15.37
肝硬変症 (%)																		1 (4.8)			1 (0.7)			1 (0.7)	85.00	
自殺/拒否 (%)																	1 (2.6)				1 (0.7)			1 (0.7)	84.00	
腸閉塞 (%)																	1 (2.6)			1 (33.3)	2 (1.4)			2 (1.4)	90.00	9.90
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)								1 (50.0)								3 (9.7)	5 (13.2)	1 (4.8)		1 (33.3)	11 (7.6)			11 (7.6)	78.09	13.94
不明 (%)													1 (20.0)			3 (9.7)	2 (5.3)	1 (4.8)	2 (25.0)		9 (6.2)			9 (6.2)	81.00	8.69
合計 (%)								2 (100.0)	3 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	5 (100.0)	10 (100.0)	19 (100.0)	31 (100.0)	38 (100.0)	21 (100.0)	8 (100.0)	3 (100.0)	145 (100.0)			145 (100.0)	76.90	11.24
記載なし																										
総計								2	3	2	1	2	5	10	19	31	38	21	8	3	145			145	76.90	11.24

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2014年調査