

表 318 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝閉塞性尿路障害

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)											1 (50.0)	1 (25.0)			2 (18.2)	4 (26.7)	3 (30.0)	6 (40.0)	1 (14.3)		18 (22.5)			18 (22.5)	78.78	11.16
脳血管障害 (%)						1 (100.0)				1 (50.0)	1 (50.0)				1 (9.1)	1 (6.7)		1 (6.7)			6 (7.5)			6 (7.5)	60.50	21.30
感染症 (%)												1 (25.0)		4 (50.0)	1 (9.1)	3 (20.0)	1 (10.0)		1 (14.3)	1 (100.0)	12 (15.0)			12 (15.0)	75.00	11.87
消化管出血 (%)														1 (12.5)				1 (6.7)			2 (2.5)			2 (2.5)	77.00	15.56
悪性腫瘍 (%)									1 (100.0)			2 (50.0)		2 (25.0)	2 (18.2)	4 (26.7)	2 (20.0)	2 (13.3)	2 (14.3)	1	16 (20.0)			16 (20.0)	73.31	12.42
悪液質/尿毒症 (%)																	1 (10.0)	1 (6.7)	1 (14.3)		3 (3.8)			3 (3.8)	85.33	4.51
心筋梗塞 (%)															2 (18.2)	1 (6.7)			1 (14.3)		4 (5.0)			4 (5.0)	78.00	9.70
カリウム中毒/頓死 (%)															1 (9.1)						1 (1.3)			1 (1.3)	74.00	
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)																1 (6.7)					1 (1.3)			1 (1.3)	78.00	
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)								1 (100.0)		1 (50.0)						1 (6.7)		1 (6.7)	2 (28.6)		6 (7.5)			6 (7.5)	71.17	26.10
不明 (%)													2 (100.0)	1 (12.5)	2 (18.2)		3 (30.0)	3 (20.0)			11 (13.8)			11 (13.8)	76.09	9.74
合計 (%)						1 (100.0)	1 (100.0)		1 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	4 (100.0)	2 (100.0)	8 (100.0)	11 (100.0)	15 (100.0)	10 (100.0)	15 (100.0)	7 (100.0)	1 (100.0)	80 (100.0)			80 (100.0)	74.90	13.87
記載なし																										
総計						1	1		1	2	2	4	2	8	11	15	10	15	7	1	80			80	74.90	13.87

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査