

表 325 2014年死亡患者死亡原因の詳細(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	3,958 (%)	2,480 (23.5)	6,438 (24.6)		6,438 (24.6)
肺水腫(溢水)	172 (%)	122 (1.0)	294 (1.1)		294 (1.1)
急性心筋梗塞(発症30日以内死亡)	642 (%)	278 (3.0)	920 (3.5)		920 (3.5)
虚血性心疾患(急性心筋梗塞以外)	226 (%)	112 (1.2)	338 (1.3)		338 (1.3)
不整脈、伝導障害	276 (%)	113 (1.2)	389 (1.5)		389 (1.5)
心内膜炎および弁膜症	102 (%)	82 (0.9)	184 (0.7)		184 (0.7)
その他の心疾患	292 (%)	178 (1.9)	470 (1.8)		470 (1.8)
くも膜下出血	78 (%)	63 (0.7)	141 (0.5)		141 (0.5)
脳内出血	695 (%)	296 (4.1)	991 (3.2)		991 (3.8)
脳梗塞	417 (%)	320 (2.5)	737 (3.4)		737 (2.8)
その他の脳血管疾患	139 (%)	90 (0.8)	229 (1.0)		229 (0.9)
敗血症	1,429 (%)	950 (8.5)	2,379 (10.1)		2,379 (9.1)
中枢神経系感染症	9 (%)	4 (0.1)	13 (0.0)		13 (0.0)
肺炎	2,292 (%)	909 (13.6)	3,201 (9.7)		3,201 (12.2)
インフルエンザ	10 (%)	6 (0.1)	16 (0.1)		16 (0.1)
尿路感染症	13 (%)	18 (0.1)	31 (0.2)		31 (0.1)
消化管・胆道系感染症・腹膜炎	137 (%)	76 (0.8)	213 (0.8)		213 (0.8)
劇症(急性)ウイルス肝炎	8 (%)	3 (0.0)	11 (0.0)		11 (0.0)
結核	20 (%)	23 (0.1)	43 (0.2)		43 (0.2)
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]感染症	1 (%)		1 (0.0)		1 (0.0)
その他の感染症	147 (%)	107 (0.9)	254 (1.1)		254 (1.0)
中枢神経系の悪性新生生物	20 (%)	6 (0.1)	26 (0.1)		26 (0.1)
呼吸器系の悪性新生生物	369 (%)	96 (2.2)	465 (1.0)		465 (1.8)
肝癌	354 (%)	86 (2.1)	440 (0.9)		440 (1.7)
肝癌以外の消化器系の悪性新生生物	482 (%)	176 (2.9)	658 (1.9)		658 (2.5)
乳房の悪性新生生物		56 (0.6)	56 (0.2)		56 (0.2)
性器の悪性新生生物	58 (%)	59 (0.6)	117 (0.4)		117 (0.4)
腎の悪性新生生物	155 (%)	30 (0.9)	185 (0.3)		185 (0.7)

表 325 2014年死亡患者死亡原因の詳細(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
内分泌腺の悪性新生物	38 (%)	21 (0.2)	59 (0.2)		59 (0.2)
造血・リンパ組織の悪性新生物	172 (%)	73 (1.0)	245 (0.9)		245 (0.9)
その他の悪性新生物	303 (%)	115 (1.8)	418 (1.6)		418 (1.6)
ウイルス性肝硬変	81 (%)	32 (0.5)	113 (0.4)		113 (0.4)
ウイルス性以外の肝硬変	125 (%)	40 (0.7)	165 (0.6)		165 (0.6)
腸の血行障害	82 (%)	79 (0.5)	161 (0.6)		161 (0.6)
イレウス	90 (%)	46 (0.5)	136 (0.5)		136 (0.5)
消化管出血	280 (%)	191 (1.7)	471 (1.8)		471 (1.8)
被囊性腹膜硬化症	9 (%)	4 (0.1)	13 (0.0)		13 (0.0)
その他の消化器疾患	140 (%)	107 (0.8)	247 (0.9)		247 (0.9)
肺梗塞、肺塞栓症	55 (%)	24 (0.3)	79 (0.3)		79 (0.3)
悪液質	352 (%)	287 (2.1)	639 (3.1)		639 (2.4)
尿毒症	185 (%)	147 (1.1)	332 (1.6)		332 (1.3)
認知症	35 (%)	28 (0.2)	63 (0.3)		63 (0.2)
その他の悪液質/尿毒症	80 (%)	56 (0.5)	136 (0.6)		136 (0.5)
高カリウム血症	90 (%)	50 (0.5)	140 (0.5)		140 (0.5)
原因不明の突然死	461 (%)	193 (2.7)	654 (2.1)		654 (2.5)
自殺	70 (%)	13 (0.4)	83 (0.1)		83 (0.3)
治療拒否(透析拒否)	96 (%)	36 (0.6)	132 (0.4)		132 (0.5)
災害・事故死	112 (%)	45 (0.7)	157 (0.5)		157 (0.6)
その他	1,463 (%)	1,040 (8.7)	2,503 (11.1)		2,503 (9.6)
合計	16,820 (100.0)	9,366 (100.0)	26,186 (100.0)		26,186 (100.0)
記載なし	2,209	1,130	3,339		3,339
総計	19,029	10,496	29,525		29,525

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査