

表 27 2014年死亡患者死亡原因の詳細(透析期間との関係)

原因	3ヶ月未満	3ヶ月～	6ヶ月～	1年～	2年～	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	合計	不明	記載なし	総計
心不全 (%)	289 (4.5)	226 (3.5)	328 (5.1)	583 (9.1)	1,573 (24.5)	1,844 (28.7)	830 (12.9)		538 (8.4)	212 (3.3)	6,423 (100.0)		5	6,438
肺水腫(溢水) (%)	21 (7.2)	10 (3.4)	11 (3.8)	23 (7.9)	81 (27.7)	78 (30.7)	38 (13.0)		22 (7.5)	8 (2.7)	292 (100.0)		2	294
急性心筋梗塞(発症30日以内死亡) (%)	31 (3.4)	23 (2.5)	39 (4.2)	70 (7.6)	239 (26.0)	304 (33.0)	125 (13.6)		64 (7.0)	25 (2.7)	920 (100.0)			920
虚血性心疾患(急性心筋梗塞以外) (%)	14 (4.2)	11 (3.3)	11 (3.3)	27 (8.0)	83 (24.6)	88 (26.1)	56 (16.6)		33 (9.8)	14 (4.2)	337 (100.0)		1	338
不整脈、伝導障害 (%)	27 (6.9)	8 (2.1)	11 (2.8)	30 (7.7)	90 (23.1)	129 (33.2)	40 (10.3)		41 (10.5)	13 (3.3)	389 (100.0)			389
心内膜炎および弁膜症 (%)	10 (5.5)	5 (2.7)	5 (4.9)	9 (16.9)	31 (29.0)	53 (29.0)	32 (17.5)		28 (15.3)	10 (5.5)	183 (100.0)	1		184
その他の心疾患 (%)	35 (7.5)	18 (3.8)	22 (4.7)	48 (10.3)	110 (23.5)	116 (24.8)	71 (15.2)		34 (7.3)	14 (3.0)	468 (100.0)	1	1	470
くも膜下出血 (%)	7 (5.0)	4 (2.8)	11 (7.8)	16 (11.3)	29 (20.6)	37 (26.2)	15 (10.6)		17 (12.1)	5 (3.5)	141 (100.0)			141
脳内出血 (%)	23 (2.3)	24 (2.4)	53 (5.3)	95 (9.6)	223 (22.5)	289 (29.2)	130 (13.1)		115 (11.6)	39 (3.9)	991 (100.0)			991
脳梗塞 (%)	28 (3.8)	17 (2.3)	33 (4.5)	63 (8.6)	177 (24.1)	209 (28.5)	116 (15.8)		71 (9.7)	20 (2.7)	734 (100.0)	2	1	737
その他の脳血管疾患 (%)	6 (2.6)	3 (1.3)	18 (7.9)	11 (4.8)	54 (23.8)	59 (26.0)	41 (18.1)		26 (11.5)	9 (4.0)	227 (100.0)	1	1	229
敗血症 (%)	167 (7.0)	115 (4.8)	133 (5.6)	178 (7.5)	465 (19.6)	624 (26.3)	345 (14.5)		229 (9.6)	121 (5.1)	2,377 (100.0)	1	1	2,379
中枢神経系感染症 (%)	2 (15.4)	1 (7.7)		2 (15.4)	4 (30.8)	2 (15.4)			2 (15.4)		13 (100.0)			13
肺炎 (%)	177 (5.5)	119 (3.7)	164 (5.8)	296 (9.3)	792 (24.8)	885 (27.7)	383 (12.0)		250 (7.8)	108 (3.4)	3,194 (100.0)	2	5	3,201
インフルエンザ (%)	1 (6.3)	3 (18.8)	1 (6.3)	1 (6.3)	1 (43.8)	7 (18.8)	3 (18.8)				16 (100.0)			16
尿路感染症 (%)	1 (3.2)	2 (6.5)	1 (3.2)	3 (9.7)	6 (19.4)	5 (16.1)	10 (32.3)		2 (6.5)	1 (3.2)	31 (100.0)			31
消化管・胆道系感染症・腹膜炎 (%)	12 (5.8)	8 (3.8)	10 (4.7)	18 (8.5)	38 (17.8)	55 (25.8)	32 (15.0)		15 (7.0)	25 (11.7)	213 (100.0)			213
劇症(急性)ウイルス肝炎 (%)	4 (36.4)	1 (9.1)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)					11 (100.0)			11
結核 (%)	6 (14.0)	6 (14.0)	6 (14.0)	6 (14.0)	5 (11.6)	8 (18.6)	3 (7.0)		2 (4.7)	1 (2.3)	43 (100.0)			43
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症 (%)	1 (100.0)										1 (100.0)			1
その他の感染症 (%)	13 (5.2)	11 (4.4)	11 (4.4)	22 (8.7)	54 (21.4)	62 (24.6)	46 (18.3)		22 (8.7)	11 (4.4)	252 (100.0)		2	254
中枢神経系の悪性新生物 (%)	1 (3.8)	1 (3.8)	1 (3.8)	4 (15.4)	8 (30.8)	5 (19.2)	4 (15.4)		2 (7.7)		26 (100.0)			26
呼吸器系の悪性新生物 (%)	13 (2.8)	15 (3.2)	33 (7.1)	60 (12.9)	142 (30.6)	116 (25.0)	48 (10.3)		25 (5.4)	12 (2.6)	464 (100.0)		1	465
肝癌 (%)	21 (4.8)	21 (4.8)	36 (8.2)	57 (13.0)	113 (25.8)	117 (26.7)	43 (9.8)		22 (5.0)	8 (1.8)	438 (100.0)		2	440
肝癌以外の消化器系の悪性新生物 (%)	26 (4.0)	26 (4.0)	40 (6.1)	100 (15.2)	173 (26.3)	170 (25.9)	83 (6.8)		45 (6.8)	14 (2.1)	657 (100.0)		1	658
乳房の悪性新生物 (%)	1 (1.8)		3 (5.4)	6 (10.7)	16 (28.6)	7 (12.5)	10 (17.9)		9 (16.1)	4 (7.1)	56 (100.0)			56
性器の悪性新生物 (%)	8 (7.0)	7 (6.1)	13 (11.3)	14 (12.2)	18 (15.7)	27 (23.5)	12 (10.4)		12 (10.4)	4 (3.5)	115 (100.0)		1	117
腎の悪性新生物 (%)	8 (4.3)	10 (5.4)	14 (7.6)	22 (12.0)	31 (16.8)	22 (12.0)	10 (10.3)		19 (10.3)	36 (19.6)	184 (100.0)		1	185
内分泌腺の悪性新生物 (%)	5 (8.5)	1 (1.7)	1 (1.7)	8 (13.8)	17 (28.8)	15 (25.4)	3 (5.1)		7 (11.9)	2 (3.4)	59 (100.0)			59
造血・リンパ組織の悪性新生物 (%)	38 (15.8)	25 (10.3)	29 (11.9)	33 (13.8)	62 (25.5)	36 (14.8)	10 (4.1)		6 (2.5)	4 (1.6)	243 (100.0)		1	245
その他の悪性新生物 (%)	28 (6.7)	22 (5.3)	34 (8.2)	50 (12.0)	108 (25.9)	82 (19.7)	51 (12.2)		26 (6.2)	16 (3.8)	417 (100.0)		1	418
ウイルス性肝硬変 (%)	10 (9.0)	3 (2.7)	6 (5.4)	16 (14.4)	24 (21.6)	25 (22.5)	4 (3.6)		10 (9.0)	13 (11.7)	111 (100.0)		1	113
ウイルス性以外の肝硬変 (%)	8 (4.8)	14 (8.5)	10 (6.1)	12 (7.3)	36 (21.8)	45 (27.3)	20 (12.1)		14 (8.5)	6 (3.6)	165 (100.0)			165
腸の血行障害 (%)	11 (6.8)	6 (3.7)	6 (3.7)	9 (5.6)	29 (18.0)	45 (28.0)	24 (14.9)		18 (11.2)	13 (8.1)	161 (100.0)			161
イレウス (%)	11 (8.1)	7 (5.1)	6 (4.4)	12 (8.8)	21 (15.4)	34 (25.0)	13 (9.6)		19 (14.0)	13 (9.6)	136 (100.0)			136
消化管出血 (%)	43 (9.1)	17 (3.6)	24 (5.1)	40 (8.5)	97 (20.6)	115 (24.5)	70 (14.9)		47 (10.0)	17 (3.6)	470 (100.0)		1	471
被覆性腹膜炎 (%)					2 (15.4)	4 (30.8)	1 (7.7)		6 (46.2)		13 (100.0)			13
その他の消化器疾患 (%)	22 (8.9)	10 (4.1)	17 (6.9)	15 (6.1)	59 (24.0)	47 (19.1)	29 (11.8)		31 (12.6)	16 (6.5)	246 (100.0)		1	247
肺梗塞、肺塞栓症 (%)	6 (7.6)	6 (7.6)	3 (3.8)	7 (8.9)	19 (24.1)	18 (22.8)	11 (13.9)		6 (7.6)	3 (3.8)	79 (100.0)			79
悪液質 (%)	20 (3.1)	26 (4.1)	33 (5.2)	52 (8.1)	161 (25.2)	199 (31.1)	68 (10.6)		51 (8.0)	29 (4.5)	639 (100.0)			639
尿毒症 (%)	27 (8.1)	14 (4.2)	20 (6.0)	32 (9.6)	74 (22.3)	87 (26.2)	39 (11.7)		25 (7.5)	14 (4.2)	332 (100.0)			332
認知症 (%)	3 (4.8)	2 (3.2)	5 (8.1)	3 (4.8)	15 (24.2)	18 (29.0)	9 (14.5)		7 (11.3)		62 (100.0)		1	63
その他の悪液質/尿毒症 (%)	14 (10.3)	2 (1.5)	6 (4.4)	13 (9.6)	25 (18.4)	40 (29.4)	18 (13.2)		9 (6.6)	9 (6.6)	136 (100.0)			136
高カリウム血症 (%)	5 (3.6)	2 (1.4)	9 (6.4)	17 (12.1)	36 (25.7)	44 (31.4)	18 (12.9)		7 (5.0)	2 (1.4)	140 (100.0)			140
原因不明の突然死 (%)	9 (1.4)	19 (2.9)	21 (3.2)	54 (8.3)	175 (26.8)	211 (32.3)	123 (14.2)		49 (7.5)	22 (3.4)	653 (100.0)		1	654
自殺 (%)	4 (4.8)	5 (6.0)	2 (2.4)	13 (15.7)	23 (27.7)	23 (27.7)	4 (4.8)		6 (7.2)	3 (3.6)	83 (100.0)			83
治療拒否(透析拒否) (%)	4 (3.1)	14 (10.7)	7 (5.3)	11 (8.4)	35 (26.7)	37 (28.2)	9 (6.9)		9 (6.9)	5 (3.8)	131 (100.0)		1	132
災害・事故死 (%)	7 (4.5)	3 (1.9)	7 (4.5)	8 (5.1)	46 (29.3)	54 (34.4)	17 (10.8)		8 (5.1)	7 (4.5)	157 (100.0)			157
その他 (%)	165 (6.6)	114 (4.6)	113 (4.5)	214 (8.6)	576 (23.1)	654 (28.2)	348 (13.9)		211 (8.4)	103 (4.1)	2,498 (100.0)	2	3	2,503
合計 (%)	1,391 (5.3)	1,005 (3.9)	1,390 (5.3)	2,385 (9.1)	6,196 (23.7)	7,153 (27.4)	3,377 (12.9)		2,217 (8.5)	1,011 (3.9)	26,127 (100.0)		22	26,186
記載なし (%)	117 (3.5)	80 (2.4)	150 (4.5)	278 (8.4)	812 (24.6)	976 (29.6)	462 (14.0)		298 (9.0)	128 (3.9)	3,301 (100.0)		4	3,339
総計 (%)	1,508 (5.1)	1,085 (3.7)	1,540 (5.2)	2,663 (9.0)	7,010 (23.8)	8,129 (27.8)	3,839 (13.0)		2,515 (8.5)	1,139 (3.9)	29,428 (100.0)	26	71	29,525

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
©Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査