

表 334 1983年以降導入2014年末患者治療方法, 透析歴別

治療方法	2年未満	2年～	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	30年～	35年～	40年～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	58,953 (86.5)	65,244 (83.7)	65,126 (83.6)	32,837 (82.0)	16,641 (78.4)	8,638 (73.2)	4,382 (66.9)	1,166 (61.7)			252,987 (82.8)	69 (80.2)		253,056 (82.8)	6.56	6.41
血液透析濾過 (%)	5,526 (8.1)	9,375 (12.0)	10,877 (14.0)	6,693 (16.7)	4,218 (19.9)	2,827 (24.0)	1,797 (27.4)	556 (29.4)			41,869 (13.7)	12 (14.0)		41,881 (13.7)	9.11	7.65
血液濾過 (%)	23 (0.0)	14 (0.0)	30 (0.0)	14 (0.0)	5 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)				89 (0.0)			89 (0.0)	6.40	5.78
血液吸着透析 (%)	2 (0.0)	5 (0.0)	18 (0.0)	56 (0.1)	186 (0.9)	281 (2.4)	348 (5.3)	159 (8.4)			1,055 (0.3)			1,055 (0.3)	23.30	5.90
在宅血液透析 (%)	38 (0.1)	104 (0.1)	154 (0.2)	92 (0.2)	66 (0.3)	34 (0.3)	15 (0.2)	5 (0.3)			508 (0.2)			508 (0.2)	9.69	7.07
腹膜透析 (%)	3,600 (5.3)	3,201 (4.1)	1,657 (2.1)	340 (0.8)	97 (0.5)	20 (0.2)	8 (0.1)	5 (0.3)			8,928 (2.9)	5 (5.8)		8,933 (2.9)	3.07	3.44
合計 (%)	68,142 (100.0)	77,943 (100.0)	77,862 (100.0)	40,032 (100.0)	21,213 (100.0)	11,802 (100.0)	6,551 (100.0)	1,891 (100.0)			305,436 (100.0)	86 (100.0)		305,522 (100.0)	6.87	6.69
記載なし																
総計	68,142	77,943	77,862	40,032	21,213	11,802	6,551	1,891			305,436	86		305,522	6.87	6.69

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査