

表 498 専従専門医の有無 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別(透析患者全体)

透析前クレアチニン 濃度	なし	あり	合計	記載なし	総計
2未満 (%)	182 (52.1)	167 (47.9)	349 (100.0)		349
2～ (%)	2,419 (49.5)	2,464 (50.5)	4,883 (100.0)		4,883
4～ (%)	8,764 (47.4)	9,712 (52.6)	18,476 (100.0)	1	18,477
6～ (%)	20,503 (45.0)	25,025 (55.0)	45,528 (100.0)		45,528
8～ (%)	32,072 (43.2)	42,168 (56.8)	74,240 (100.0)		74,240
10～ (%)	29,679 (41.8)	41,306 (58.2)	70,985 (100.0)		70,985
12～ (%)	17,463 (41.1)	25,042 (58.9)	42,505 (100.0)		42,505
14～ (%)	6,902 (40.2)	10,254 (59.8)	17,156 (100.0)		17,156
16～ (%)	2,497 (40.2)	3,717 (59.8)	6,214 (100.0)		6,214
合計 (%)	120,481 (43.0)	159,855 (57.0)	280,336 (100.0)	1	280,337
記載なし (%)	12,859 (43.2)	16,912 (56.8)	29,771 (100.0)		29,771
総計 (%)	133,340 (43.0)	176,767 (57.0)	310,107 (100.0)	1	310,108
平均	9.79	10.02	9.92	5.40	9.92
標準偏差	2.97	2.91	2.94		2.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査