

表 503 専従専門医の有無 PTH値(pg/mL)別(透析患者全体、PTH測定法:intact-PTH)

PTH値	なし	あり	合計	記載なし	総計
20未満 (%)	5,850 (49.3)	6,023 (50.7)	11,873 (100.0)		11,873
20～ (%)	8,078 (47.7)	8,868 (52.3)	16,946 (100.0)		16,946
40～ (%)	8,180 (45.4)	9,836 (54.6)	18,016 (100.0)		18,016
60～ (%)	8,550 (44.5)	10,680 (55.5)	19,230 (100.0)		19,230
80～ (%)	8,544 (43.6)	11,069 (56.4)	19,613 (100.0)		19,613
100～ (%)	8,342 (43.5)	10,815 (56.5)	19,157 (100.0)	1	19,158
120～ (%)	7,921 (43.5)	10,301 (56.5)	18,222 (100.0)		18,222
140～ (%)	7,249 (43.1)	9,558 (56.9)	16,807 (100.0)		16,807
160～ (%)	6,532 (43.1)	8,641 (56.9)	15,173 (100.0)		15,173
180～ (%)	14,815 (42.9)	19,698 (57.1)	34,513 (100.0)		34,513
240～ (%)	200 (45.0)	244 (55.0)	444 (100.0)		444
241～ (%)	8,493 (42.8)	11,346 (57.2)	19,839 (100.0)		19,839
300～ (%)	4,996 (43.3)	6,530 (56.7)	11,526 (100.0)		11,526
360～ (%)	2,935 (43.9)	3,749 (56.1)	6,684 (100.0)		6,684
420～ (%)	1,695 (43.2)	2,230 (56.8)	3,925 (100.0)		3,925
480～ (%)	415 (43.0)	549 (57.0)	964 (100.0)		964
500～ (%)	692 (44.2)	872 (55.8)	1,564 (100.0)		1,564
540～ (%)	781 (45.6)	933 (54.4)	1,714 (100.0)		1,714
600～ (%)	1,266 (45.2)	1,533 (54.8)	2,799 (100.0)		2,799
800～ (%)	1,012 (46.8)	1,150 (53.2)	2,162 (100.0)		2,162
合計 (%)	106,546 (44.2)	134,625 (55.8)	241,171 (100.0)	1	241,172
記載なし (%)	2,967 (46.5)	3,417 (53.5)	6,384 (100.0)		6,384
総計 (%)	109,513 (44.2)	138,042 (55.8)	247,555 (100.0)	1	247,556
平均	170.67	173.37	172.18	103.00	172.17
標準偏差	168.95	159.86	163.94		163.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査