

表 506 専従専門医の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別(透析患者全体)

総コレステロール 濃度	なし	あり	合計	記載なし	総計
100未満 (%)	3,558 (45.4)	4,272 (54.6)	7,830 (100.0)		7,830
100～ (%)	10,061 (44.3)	12,661 (55.7)	22,722 (100.0)		22,722
120～ (%)	18,303 (43.4)	23,898 (56.6)	42,201 (100.0)		42,201
140～ (%)	20,515 (42.2)	28,144 (57.8)	48,659 (100.0)		48,659
160～ (%)	16,802 (41.8)	23,440 (58.2)	40,242 (100.0)	1	40,243
180～ (%)	10,533 (41.3)	14,992 (58.7)	25,525 (100.0)		25,525
200～ (%)	5,572 (40.6)	8,151 (59.4)	13,723 (100.0)		13,723
220～ (%)	2,466 (40.6)	3,605 (59.4)	6,071 (100.0)		6,071
240～ (%)	1,021 (42.5)	1,379 (57.5)	2,400 (100.0)		2,400
260～ (%)	676 (42.6)	910 (57.4)	1,586 (100.0)		1,586
合計 (%)	89,507 (42.4)	121,452 (57.6)	210,959 (100.0)	1	210,960
記載なし (%)	43,833 (44.2)	55,315 (55.8)	99,148 (100.0)		99,148
総計 (%)	133,340 (43.0)	176,767 (57.0)	310,107 (100.0)	1	310,108
平均	154.94	156.54	155.86	173.00	155.86
標準偏差	35.83	35.65	35.74		35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査