

表 508 専従専門医の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別(透析患者全体)

透析前収縮 期血圧	なし	あり	合計	記載なし	総計
60未満 (%)	15 (37.5)	25 (62.5)	40 (100.0)	1	40
60～ (%)	173 (40.0)	260 (60.0)	433 (100.0)		433
80～ (%)	1,372 (41.1)	1,965 (58.9)	3,337 (100.0)		3,338
100～ (%)	7,514 (42.7)	10,093 (57.3)	17,607 (100.0)		17,607
120～ (%)	22,376 (42.0)	30,895 (58.0)	53,271 (100.0)		53,271
140～ (%)	34,115 (42.2)	46,707 (57.8)	80,822 (100.0)		80,822
160～ (%)	25,141 (43.2)	33,054 (56.8)	58,195 (100.0)		58,195
180～ (%)	9,825 (44.2)	12,399 (55.8)	22,224 (100.0)		22,224
200～ (%)	2,479 (44.7)	3,067 (55.3)	5,546 (100.0)		5,546
220～ (%)	524 (45.2)	636 (54.8)	1,160 (100.0)		1,160
合計 (%)	103,534 (42.7)	139,101 (57.3)	242,635 (100.0)	1	242,636
記載なし (%)	29,806 (44.2)	37,666 (55.8)	67,472 (100.0)		67,472
総計 (%)	133,340 (43.0)	176,767 (57.0)	310,107 (100.0)	1	310,108
平均	151.48	150.86	151.13	98.00	151.13
標準偏差	24.38	24.11	24.23		24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査