

表 509 専従専門医の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別(透析患者全体)

透析前拡張期血圧	なし	あり	合計	記載なし	総計
20未満	32	48	80		80
(%)	(40.0)	(60.0)	(100.0)		
20～	319	477	796		796
(%)	(40.1)	(59.9)	(100.0)		
40～	8,847	11,632	20,479	1	20,480
(%)	(43.2)	(56.8)	(100.0)		
60～	47,704	64,174	111,878		111,878
(%)	(42.6)	(57.4)	(100.0)		
80～	25,384	34,303	59,687		59,687
(%)	(42.5)	(57.5)	(100.0)		
90～	13,780	18,471	32,251		32,251
(%)	(42.7)	(57.3)	(100.0)		
100～	6,719	9,052	15,771		15,771
(%)	(42.6)	(57.4)	(100.0)		
120～	389	575	964		964
(%)	(40.4)	(59.6)	(100.0)		
140～	29	46	75		75
(%)	(38.7)	(61.3)	(100.0)		
合計	103,203	138,778	241,981	1	241,982
(%)	(42.6)	(57.4)	(100.0)		
記載なし	30,137	37,989	68,126		68,126
(%)	(44.2)	(55.8)	(100.0)		
総計	133,340	176,767	310,107	1	310,108
(%)	(43.0)	(57.0)	(100.0)		
平均	77.73	77.81	77.77	50.00	77.77
標準偏差	14.42	14.47	14.45		14.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査