

表 519 専従専門医の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別(施設血液透析患者)

透析前アルブミン 濃度	なし	あり	合計	記載なし	総計
1.5未満	81	78	159		159
(%)	(50.9)	(49.1)	(100.0)		
1.5～	449	403	852		852
(%)	(52.7)	(47.3)	(100.0)		
2.0～	1,748	1,687	3,435		3,435
(%)	(50.9)	(49.1)	(100.0)		
2.5～	6,347	6,545	12,892		12,892
(%)	(49.2)	(50.8)	(100.0)		
3.0～	24,806	29,632	54,438		54,438
(%)	(45.6)	(54.4)	(100.0)		
3.5～	46,756	64,441	111,197		111,197
(%)	(42.0)	(58.0)	(100.0)		
4.0～	17,255	25,059	42,314		42,314
(%)	(40.8)	(59.2)	(100.0)		
4.5～	1,018	1,486	2,504		2,504
(%)	(40.7)	(59.3)	(100.0)		
5.0～	82	96	178		178
(%)	(46.1)	(53.9)	(100.0)		
合計	98,542	129,427	227,969		227,969
(%)	(43.2)	(56.8)	(100.0)		
記載なし	11,950	15,722	27,672		27,672
(%)	(43.2)	(56.8)	(100.0)		
総計	110,492	145,149	255,641		255,641
(%)	(43.2)	(56.8)	(100.0)		
平均	3.57	3.62	3.60		3.60
標準偏差	0.46	0.44	0.45		0.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査