

表 526 専従専門医の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別(施設血液透析患者)

総コレステロール 濃度	なし	あり	合計	記載なし	総計
100未満	3,042	3,677	6,719		6,719
(%)	(45.3)	(54.7)	(100.0)		
100～	8,538	10,818	19,356		19,356
(%)	(44.1)	(55.9)	(100.0)		
120～	15,511	20,111	35,622		35,622
(%)	(43.5)	(56.5)	(100.0)		
140～	17,049	23,323	40,372		40,372
(%)	(42.2)	(57.8)	(100.0)		
160～	13,738	19,141	32,879		32,879
(%)	(41.8)	(58.2)	(100.0)		
180～	8,545	11,937	20,482		20,482
(%)	(41.7)	(58.3)	(100.0)		
200～	4,434	6,270	10,704		10,704
(%)	(41.4)	(58.6)	(100.0)		
220～	1,954	2,751	4,705		4,705
(%)	(41.5)	(58.5)	(100.0)		
240～	795	1,027	1,822		1,822
(%)	(43.6)	(56.4)	(100.0)		
260～	527	672	1,199		1,199
(%)	(44.0)	(56.0)	(100.0)		
合計	74,133	99,727	173,860		173,860
(%)	(42.6)	(57.4)	(100.0)		
記載なし	36,359	45,422	81,781		81,781
(%)	(44.5)	(55.5)	(100.0)		
総計	110,492	145,149	255,641		255,641
(%)	(43.2)	(56.8)	(100.0)		
平均	154.13	155.37	154.84		154.84
標準偏差	35.59	35.23	35.39		35.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査