

表 529 専従専門医の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別(施設血液透析患者)

透析前拡張期血圧	なし	あり	合計	記載なし	総計
20未満 (%)	29 (40.8)	42 (59.2)	71 (100.0)		71
20～ (%)	257 (39.8)	389 (60.2)	646 (100.0)		646
40～ (%)	7,432 (43.3)	9,717 (56.7)	17,149 (100.0)		17,149
60～ (%)	40,029 (42.8)	53,496 (57.2)	93,525 (100.0)		93,525
80～ (%)	20,955 (43.0)	27,814 (57.0)	48,769 (100.0)		48,769
90～ (%)	11,152 (43.1)	14,745 (56.9)	25,897 (100.0)		25,897
100～ (%)	5,331 (42.4)	7,249 (57.6)	12,580 (100.0)		12,580
120～ (%)	317 (41.1)	454 (58.9)	771 (100.0)		771
140～ (%)	23 (37.1)	39 (62.9)	62 (100.0)		62
合計 (%)	85,525 (42.9)	113,945 (57.1)	199,470 (100.0)		199,470
記載なし (%)	24,967 (44.4)	31,204 (55.6)	56,171 (100.0)		56,171
総計 (%)	110,492 (43.2)	145,149 (56.8)	255,641 (100.0)		255,641
平均	77.48	77.55	77.52		77.52
標準偏差	14.34	14.42	14.39		14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査