

表 537 専従専門医の有無 クレアチニン濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

クレアチニン 濃度	なし	あり	合計	記載なし	総計
2未満	13	4	17		17
(%)	(76.5)	(23.5)	(100.0)		
2～	81	73	154		154
(%)	(52.6)	(47.4)	(100.0)		
4～	241	333	574	1	575
(%)	(42.0)	(58.0)	(100.0)		
6～	459	674	1,133		1,133
(%)	(40.5)	(59.5)	(100.0)		
8～	537	812	1,349		1,349
(%)	(39.8)	(60.2)	(100.0)		
10～	440	675	1,115		1,115
(%)	(39.5)	(60.5)	(100.0)		
12～	339	509	848		848
(%)	(40.0)	(60.0)	(100.0)		
14～	183	305	488		488
(%)	(37.5)	(62.5)	(100.0)		
16～	112	183	295		295
(%)	(38.0)	(62.0)	(100.0)		
合計	2,405	3,568	5,973	1	5,974
(%)	(40.3)	(59.7)	(100.0)		
記載なし	984	1,983	2,967		2,967
(%)	(33.2)	(66.8)	(100.0)		
総計	3,389	5,551	8,940	1	8,941
(%)	(37.9)	(62.1)	(100.0)		
平均	9.73	9.99	9.89	5.40	9.89
標準偏差	3.59	3.48	3.53		3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査