

表 538 専従専門医の有無 アルブミン濃度(g/dL)別(腹膜透析患者)

アルブミン 濃度	なし	あり	合計	記載なし	総計
1.5未満 (%)	10 (66.7)	5 (33.3)	15 (100.0)		15
1.5～ (%)	38 (53.5)	33 (46.5)	71 (100.0)		71
2.0～ (%)	161 (54.2)	136 (45.8)	297 (100.0)	1	298
2.5～ (%)	435 (41.9)	602 (58.1)	1,037 (100.0)		1,037
3.0～ (%)	854 (39.6)	1,304 (60.4)	2,158 (100.0)		2,158
3.5～ (%)	706 (37.0)	1,200 (63.0)	1,906 (100.0)		1,906
4.0～ (%)	167 (38.7)	264 (61.3)	431 (100.0)		431
4.5～ (%)	7 (33.3)	14 (66.7)	21 (100.0)		21
5.0～ (%)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)		2
合計 (%)	2,379 (40.1)	3,559 (59.9)	5,938 (100.0)	1	5,939
記載なし (%)	1,010 (33.6)	1,992 (66.4)	3,002 (100.0)		3,002
総計 (%)	3,389 (37.9)	5,551 (62.1)	8,940 (100.0)	1	8,941
平均	3.23	3.31	3.28	2.20	3.28
標準偏差	0.55	0.49	0.52		0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査