

表 546 専従専門医の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

HDL-C濃度	なし	あり	合計	記載なし	総計
20未満	1	6	7	1	8
(%)	(14.3)	(85.7)	(100.0)		
20～	100	188	288		288
(%)	(34.7)	(65.3)	(100.0)		
30～	329	604	933		933
(%)	(35.3)	(64.7)	(100.0)		
40～	363	627	990		990
(%)	(36.7)	(63.3)	(100.0)		
50～	309	530	839		839
(%)	(36.8)	(63.2)	(100.0)		
60～	194	322	516		516
(%)	(37.6)	(62.4)	(100.0)		
70～	99	160	259		259
(%)	(38.2)	(61.8)	(100.0)		
80～	40	101	141		141
(%)	(28.4)	(71.6)	(100.0)		
90～	22	39	61		61
(%)	(36.1)	(63.9)	(100.0)		
100～	14	43	57		57
(%)	(24.6)	(75.4)	(100.0)		
合計	1,471	2,620	4,091	1	4,092
(%)	(36.0)	(64.0)	(100.0)		
記載なし	1,918	2,931	4,849		4,849
(%)	(39.6)	(60.4)	(100.0)		
総計	3,389	5,551	8,940	1	8,941
(%)	(37.9)	(62.1)	(100.0)		
平均	50.16	50.66	50.48	17.00	50.47
標準偏差	16.64	18.29	17.72		17.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査