

表 547 専従専門医の有無 収縮期血圧(mmHg)別(腹膜透析患者)

収縮期血圧	なし	あり	合計	記載なし	総計
60未満 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)		1
60～ (%)	5 (38.5)	8 (61.5)	13 (100.0)		13
80～ (%)	44 (35.8)	79 (64.2)	123 (100.0)	1	124
100～ (%)	243 (37.9)	398 (62.1)	641 (100.0)		641
120～ (%)	579 (38.2)	937 (61.8)	1,516 (100.0)		1,516
140～ (%)	617 (39.1)	962 (60.9)	1,579 (100.0)		1,579
160～ (%)	293 (40.6)	428 (59.4)	721 (100.0)		721
180～ (%)	77 (35.5)	140 (64.5)	217 (100.0)		217
200～ (%)	14 (45.2)	17 (54.8)	31 (100.0)		31
220～ (%)	5 (50.0)	5 (50.0)	10 (100.0)		10
合計 (%)	1,878 (38.7)	2,974 (61.3)	4,852 (100.0)	1	4,853
記載なし (%)	1,511 (37.0)	2,577 (63.0)	4,088 (100.0)		4,088
総計 (%)	3,389 (37.9)	5,551 (62.1)	8,940 (100.0)	1	8,941
平均	141.36	140.80	141.02	98.00	141.01
標準偏差	22.93	22.84	22.87		22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査