

表 548 専従専門医の有無 拡張期血圧(mmHg)別(腹膜透析患者)

拡張期血圧	なし	あり	合計	記載なし	総計
20未満 (%)		1 (100.0)	1 (100.0)		1
20～ (%)	8 (53.3)	7 (46.7)	15 (100.0)		15
40～ (%)	166 (44.4)	208 (55.6)	374 (100.0)	1	375
60～ (%)	795 (38.5)	1,270 (61.5)	2,065 (100.0)		2,065
80～ (%)	492 (38.0)	804 (62.0)	1,296 (100.0)		1,296
90～ (%)	286 (40.1)	428 (59.9)	714 (100.0)		714
100～ (%)	124 (35.7)	223 (64.3)	347 (100.0)		347
120～ (%)	4 (22.2)	14 (77.8)	18 (100.0)		18
140～ (%)		1 (100.0)	1 (100.0)		1
合計 (%)	1,875 (38.8)	2,956 (61.2)	4,831 (100.0)	1	4,832
記載なし (%)	1,514 (36.8)	2,595 (63.2)	4,109 (100.0)		4,109
総計 (%)	3,389 (37.9)	5,551 (62.1)	8,940 (100.0)	1	8,941
平均	78.42	79.40	79.02	50.00	79.01
標準偏差	14.62	14.29	14.43		14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査