

表 549 専従専門医の有無 脈拍(拍/分)別(腹膜透析患者)

脈拍	なし	あり	合計	記載なし	総計
40未満	2	3	5		5
(%)	(40.0)	(60.0)	(100.0)		
40～	11	14	25		25
(%)	(44.0)	(56.0)	(100.0)		
50～	62	125	187		187
(%)	(33.2)	(66.8)	(100.0)		
60～	366	484	850		850
(%)	(43.1)	(56.9)	(100.0)		
70～	468	803	1,271		1,271
(%)	(36.8)	(63.2)	(100.0)		
80～	370	654	1,024		1,024
(%)	(36.1)	(63.9)	(100.0)		
90～	197	284	481		481
(%)	(41.0)	(59.0)	(100.0)		
100～	69	135	204		204
(%)	(33.8)	(66.2)	(100.0)		
110～	20	32	52		52
(%)	(38.5)	(61.5)	(100.0)		
120～	8	11	19	1	20
(%)	(42.1)	(57.9)	(100.0)		
合計	1,573	2,545	4,118	1	4,119
(%)	(38.2)	(61.8)	(100.0)		
記載なし	1,816	3,006	4,822		4,822
(%)	(37.7)	(62.3)	(100.0)		
総計	3,389	5,551	8,940	1	8,941
(%)	(37.9)	(62.1)	(100.0)		
平均	77.79	78.25	78.08	126.00	78.09
標準偏差	13.25	13.25	13.25		13.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査