

表 2159 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 前希釈)

透析後体重	1未満	1~	5~	10~	15~	20~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											
20~ (%)											
30~ (%)	1 (16.7)			4 (66.7)		1 (16.7)	6 (100.0)		6	10.67	5.16
40~ (%)	13 (14.4)	35 (38.9)	31 (34.4)	1 (1.1)	10 (11.1)	90 (100.0)	4	94	9.76	6.07	
50~ (%)	21 (14.7)	42 (29.4)	58 (40.6)	4 (2.8)	18 (12.6)	143 (100.0)	4	147	10.35	6.74	
60~ (%)	13 (15.7)	26 (31.3)	26 (31.3)	2 (2.4)	16 (19.3)	83 (100.0)	3	86	10.94	7.48	
70~ (%)	9 (20.0)	11 (24.4)	15 (33.3)	2 (4.4)	8 (17.8)	45 (100.0)		45	10.64	7.76	
80~ (%)	1 (11.1)	3 (33.3)	3 (33.3)		2 (22.2)	9 (100.0)		9	11.56	8.29	
90~ (%)		1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	11.00	4.24	
100~ (%)				2 (100.0)		2 (100.0)		2	10.00		
110~ (%)											
120~ (%)		1 (100.0)				1 (100.0)		1	8.00		
合計 (%)		58 (15.2)	119 (31.2)	140 (36.7)	9 (2.4)	55 (14.4)	381 (100.0)	11	392	10.40	6.83
記載なし (%)				1 (100.0)			1 (100.0)	1	2	14.00	
総計 (%)		58 (15.2)	119 (31.2)	141 (36.9)	9 (2.4)	55 (14.4)	382 (100.0)	12	394	10.41	6.83
平均		57.98	57.47	58.11	60.54	60.37	58.27	55.17	58.19		
標準偏差		10.74	12.20	11.75	10.00	10.90	11.58	6.82	11.48		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査