

表 2193 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別（オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 前希釈）

透析後体重	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)								1 (50.0)	1 (50.0)					2 (100.0)		2	49.00	1.41
20～ (%)		2 (5.3)		4 (10.5)		12 (31.6)	11 (28.9)	6 (15.8)	1 (2.6)	1 (2.6)		1 (2.6)		38 (100.0)	2	40	30.63	16.11
30～ (%)		37 (2.5)	59 (3.9)	64 (4.2)	56 (3.7)	305 (20.3)	340 (22.6)	470 (31.2)	74 (4.9)	71 (4.7)	16 (1.1)	10 (0.7)	4 (0.3)	1,506 (100.0)	53	1,559	34.49	15.52
40～ (%)		68 (1.5)	121 (2.8)	135 (3.1)	127 (2.9)	758 (17.2)	893 (20.3)	1,540 (35.0)	291 (6.6)	345 (7.8)	71 (1.6)	32 (0.7)	17 (0.4)	4,398 (100.0)	113	4,511	37.82	15.67
50～ (%)		35 (1.3)	57 (2.2)	58 (2.2)	58 (2.2)	373 (14.3)	509 (19.5)	1,002 (38.3)	180 (6.9)	245 (9.4)	60 (2.3)	23 (0.9)	15 (0.6)	2,615 (100.0)	62	2,677	40.01	15.68
60～ (%)		15 (1.6)	25 (2.7)	22 (2.4)	16 (1.8)	136 (14.9)	158 (17.3)	332 (36.4)	74 (8.1)	90 (9.9)	24 (2.6)	12 (1.3)	7 (0.8)	911 (100.0)	20	931	40.13	16.58
70～ (%)		2 (0.7)	5 (1.8)	6 (2.1)	3 (1.1)	46 (16.4)	60 (21.4)	106 (37.7)	17 (6.0)	27 (9.6)	7 (2.5)	2 (0.7)		281 (100.0)	7	288	39.67	14.56
80～ (%)				2 (1.9)	1 (0.9)	12 (11.3)	23 (21.7)	36 (34.0)	8 (7.5)	16 (15.1)	3 (2.8)	3 (2.8)	2 (1.9)	106 (100.0)	1	107	44.84	17.11
90～ (%)						3 (14.3)	4 (19.0)	7 (33.3)	2 (9.5)	3 (14.3)		1 (4.8)	1 (4.8)	21 (100.0)		21	47.62	22.14
100～ (%)							1 (20.0)	2 (40.0)		2 (40.0)				5 (100.0)		5	47.00	13.04
110～ (%)				1 (33.3)			1 (33.3)	1 (33.3)						3 (100.0)	1	4	32.00	18.33
120～ (%)																		
合計 (%)		159 (1.6)	267 (2.7)	292 (3.0)	261 (2.6)	1,645 (16.6)	2,000 (20.2)	3,503 (35.4)	648 (6.6)	800 (8.1)	181 (1.8)	84 (0.8)	46 (0.5)	9,886 (100.0)	259	10,145	38.23	15.87
記載なし (%)			1 (1.2)		2 (2.4)	9 (11.0)	18 (22.0)	33 (40.2)	4 (4.9)	15 (18.3)				82 (100.0)	93	175	43.87	14.29
総計 (%)		159 (1.6)	268 (2.7)	292 (2.9)	263 (2.6)	1,654 (16.6)	2,018 (20.2)	3,536 (35.5)	652 (6.5)	815 (8.2)	181 (1.8)	84 (0.8)	46 (0.5)	9,968 (100.0)	352	10,320	38.28	15.86
平均		46.68	47.22	47.09	46.74	48.08	48.82	49.71	50.44	51.32	51.89	52.03	52.53	49.24	48.19	49.21		
標準偏差		9.21	9.37	10.76	8.91	10.00	10.42	10.11	9.99	10.74	10.18	12.68	11.98	10.26	10.39	10.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査