

表 2227 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 後希釈)

透析後体重	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											
20～ (%)											
30～ (%)		4 (11.8)	22 (64.7)	8 (23.5)			34 (100.0)	2	36	7.09	2.26
40～ (%)		32 (8.1)	229 (57.7)	133 (33.5)	2 (0.5)	1 (0.3)	397 (100.0)	20	417	7.93	2.32
50～ (%)		60 (6.9)	477 (54.6)	334 (38.2)	2 (0.2)	1 (0.1)	874 (100.0)	34	908	8.11	2.14
60～ (%)		31 (4.9)	335 (53.1)	264 (41.8)		1 (0.2)	631 (100.0)	26	657	8.34	2.15
70～ (%)		18 (7.6)	107 (45.0)	111 (46.6)	1 (0.4)	1 (0.4)	238 (100.0)	11	249	8.55	2.49
80～ (%)		4 (4.3)	45 (48.4)	44 (47.3)			93 (100.0)	2	95	8.68	2.16
90～ (%)		2 (5.0)	15 (37.5)	23 (57.5)			40 (100.0)	3	43	8.80	1.80
100～ (%)			3 (27.3)	8 (72.7)			11 (100.0)		11	9.09	2.07
110～ (%)			4 (50.0)	4 (50.0)			8 (100.0)		8	8.25	1.98
120～ (%)				6 (100.0)			6 (100.0)		6	10.33	0.82
合計 (%)		151 (6.5)	1,237 (53.0)	935 (40.1)	5 (0.2)	4 (0.2)	2,332 (100.0)	98	2,430	8.22	2.22
記載なし (%)		6 (16.2)	22 (59.5)	9 (24.3)			37 (100.0)	6	43	7.27	2.13
総計 (%)		157 (6.6)	1,259 (53.1)	944 (39.8)	5 (0.2)	4 (0.2)	2,369 (100.0)	104	2,473	8.21	2.22
平均		57.84	59.13	62.08	55.62	59.13	60.22	59.46	60.19		
標準偏差		11.30	11.64	13.68	10.63	11.78	12.57	11.88	12.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査