

表 2228 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 後希釈)

透析後体重	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											
20～ (%)		2 (18.2)	8 (72.7)	1 (9.1)			11 (100.0)		11	6.91	1.87
30～ (%)		50 (14.5)	209 (60.6)	83 (24.1)	2 (0.6)	1 (0.3)	345 (100.0)	8	353	7.26	2.35
40～ (%)		65 (9.1)	407 (56.7)	242 (33.7)	3 (0.4)	1 (0.1)	718 (100.0)	37	755	7.85	2.33
50～ (%)		38 (10.0)	200 (52.5)	142 (37.3)	1 (0.3)		381 (100.0)	22	403	7.91	2.27
60～ (%)		8 (6.7)	69 (57.5)	43 (35.8)			120 (100.0)	10	130	8.02	2.00
70～ (%)		2 (7.7)	16 (61.5)	8 (30.8)			26 (100.0)	1	27	8.23	2.16
80～ (%)			7 (70.0)	3 (30.0)			10 (100.0)		10	8.30	1.49
90～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	9.00	1.41
100～ (%)											
110～ (%)											
120～ (%)											
合計 (%)		165 (10.2)	917 (56.9)	523 (32.4)	6 (0.4)	2 (0.1)	1,613 (100.0)	78	1,691	7.76	2.30
記載なし (%)		4 (14.8)	18 (66.7)	4 (14.8)		1 (3.7)	27 (100.0)	3	30	7.44	3.24
総計 (%)		169 (10.3)	935 (57.0)	527 (32.1)	6 (0.4)	3 (0.2)	1,640 (100.0)	81	1,721	7.75	2.32
平均		45.48	47.07	48.39	43.02	39.75	47.31	49.28	47.40		
標準偏差		9.10	9.82	9.17	7.57	13.79	9.57	8.38	9.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査