

表 2262 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別（オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 後希釈）

| 透析後体重       | 1未満 | 1～          | 5～            | 10～           | 15～          | 20～           | 合計             | 記載なし  | 総計    | 平均    | 標準偏差 |
|-------------|-----|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------|-------|-------|------|
| 20未満<br>(%) |     |             |               |               |              | 1<br>(100.0)  | 1<br>(100.0)   |       | 1     | 20.00 |      |
| 20～<br>(%)  |     |             |               |               |              |               |                | 1     | 1     |       |      |
| 30～<br>(%)  |     |             | 1<br>(20.0)   | 2<br>(40.0)   | 1<br>(20.0)  | 1<br>(20.0)   | 5<br>(100.0)   |       | 5     | 14.00 | 5.10 |
| 40～<br>(%)  |     | 7<br>(6.1)  | 47<br>(40.9)  | 44<br>(38.3)  | 7<br>(6.1)   | 10<br>(8.7)   | 115<br>(100.0) | 2     | 117   | 10.28 | 5.14 |
| 50～<br>(%)  |     | 18<br>(6.3) | 98<br>(34.3)  | 115<br>(40.2) | 27<br>(9.4)  | 28<br>(9.8)   | 286<br>(100.0) | 4     | 290   | 10.64 | 4.80 |
| 60～<br>(%)  |     | 7<br>(3.3)  | 60<br>(28.0)  | 92<br>(43.0)  | 24<br>(11.2) | 31<br>(14.5)  | 214<br>(100.0) | 3     | 217   | 11.76 | 5.13 |
| 70～<br>(%)  |     | 3<br>(3.1)  | 31<br>(32.3)  | 37<br>(38.5)  | 9<br>(9.4)   | 16<br>(16.7)  | 96<br>(100.0)  | 2     | 98    | 12.11 | 5.53 |
| 80～<br>(%)  |     | 3<br>(7.5)  | 6<br>(15.0)   | 19<br>(47.5)  | 2<br>(5.0)   | 10<br>(25.0)  | 40<br>(100.0)  | 1     | 41    | 13.10 | 6.47 |
| 90～<br>(%)  |     | 1<br>(5.9)  | 3<br>(17.6)   | 8<br>(47.1)   | 2<br>(11.8)  | 3<br>(17.6)   | 17<br>(100.0)  |       | 17    | 11.88 | 5.52 |
| 100～<br>(%) |     |             |               |               | 1<br>(100.0) |               | 1<br>(100.0)   |       | 1     | 15.00 |      |
| 110～<br>(%) |     |             |               |               |              |               |                |       |       |       |      |
| 120～<br>(%) |     |             |               | 1<br>(100.0)  |              |               | 1<br>(100.0)   |       | 1     | 13.00 |      |
| 合計<br>(%)   |     | 39<br>(5.0) | 246<br>(31.7) | 318<br>(41.0) | 73<br>(9.4)  | 100<br>(12.9) | 776<br>(100.0) | 13    | 789   | 11.27 | 5.19 |
| 記載なし<br>(%) |     |             | 17<br>(48.6)  | 16<br>(45.7)  | 1<br>(2.9)   | 1<br>(2.9)    | 35<br>(100.0)  |       | 35    | 9.69  | 2.56 |
| 総計<br>(%)   |     | 39<br>(4.8) | 263<br>(32.4) | 334<br>(41.2) | 74<br>(9.1)  | 101<br>(12.5) | 811<br>(100.0) | 13    | 824   | 11.20 | 5.12 |
| 平均          |     | 59.53       | 58.81         | 61.75         | 62.38        | 63.71         | 61.02          | 58.22 | 60.97 |       |      |
| 標準偏差        |     | 12.16       | 10.97         | 12.23         | 11.95        | 14.23         | 12.19          | 15.55 | 12.25 |       |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査