

表 2055 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)		6 (100.0)			6 (100.0)			6
0.4～ (%)	14 (14.9)	80 (85.1)			94 (100.0)		28	122
0.6～ (%)	101 (13.5)	645 (86.3)	1 (0.1)		747 (100.0)		141	888
0.8～ (%)	148 (12.9)	995 (86.9)		2 (0.2)	1,145 (100.0)		211	1,356
1.0～ (%)	55 (13.2)	363 (86.8)			418 (100.0)		75	493
1.2～ (%)	9 (13.0)	59 (85.5)	1 (1.4)		69 (100.0)		8	77
1.4～ (%)		6 (100.0)			6 (100.0)			6
1.6～ (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
1.8～ (%)								
2.0～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		1	3
合計 (%)	327 (13.1)	2,157 (86.7)	2 (0.1)	2 (0.1)	2,488 (100.0)		464	2,952
記載なし (%)	24 (17.5)	111 (81.0)	1 (0.7)	1 (0.7)	137 (100.0)		46	183
総計 (%)	351 (13.4)	2,268 (86.4)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,625 (100.0)		510	3,135
平均	0.86	0.87	0.97	0.89	0.87		0.85	0.86
標準偏差	0.16	0.17	0.37	0.06	0.17		0.19	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査