

表 2056 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	1 (20.0)	4 (80.0)			5 (100.0)		3	8
0.4～ (%)	6 (9.1)	60 (90.9)			66 (100.0)		12	78
0.6～ (%)	49 (11.4)	379 (88.6)			428 (100.0)		93	521
0.8～ (%)	98 (13.5)	624 (86.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	724 (100.0)		107	831
1.0～ (%)	41 (9.7)	382 (90.3)			423 (100.0)		91	514
1.2～ (%)	9 (10.5)	76 (88.4)	1 (1.2)		86 (100.0)		13	99
1.4～ (%)	1 (7.7)	12 (92.3)			13 (100.0)		2	15
1.6～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)			2
1.8～ (%)								
2.0～ (%)								
合計 (%)	205 (11.7)	1,539 (88.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,747 (100.0)		321	2,068
記載なし (%)	9 (11.1)	72 (88.9)			81 (100.0)		36	117
総計 (%)	214 (11.7)	1,611 (88.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,828 (100.0)		357	2,185
平均	0.89	0.90	1.04	0.89	0.90		0.90	0.90
標準偏差	0.17	0.18	0.23		0.18		0.19	0.18

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査