

表 2057 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満(%)					11		4	15
2～(%)	1 (9.1)	10 (90.9)			(100.0)		16	86
4～(%)	8 (11.4)	62 (88.6)			70 (100.0)		45	261
6～(%)	29 (13.4)	187 (86.6)			216 (100.0)		116	701
8～(%)	85 (14.5)	499 (85.3)	1 (0.2)		585 (100.0)		129	875
10～(%)	98 (13.1)	646 (86.6)		2 (0.3)	746 (100.0)		110	687
12～(%)	73 (12.7)	501 (86.8)	2 (0.3)	1 (0.2)	577 (100.0)		48	317
14～(%)	34 (12.6)	235 (87.4)			269 (100.0)		19	127
16～(%)	21 (19.4)	87 (80.6)			108 (100.0)			
合計(%)	349 (13.5)	2,227 (86.3)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,582 (100.0)		487	3,069
記載なし(%)	2 (4.7)	41 (95.3)			43 (100.0)		23	66
総計(%)	351 (13.4)	2,268 (86.4)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,625 (100.0)		510	3,135
平均	11.13	11.10	12.20	11.97	11.11		10.97	11.08
標準偏差	2.81	2.75	2.01	1.76	2.75		2.88	2.78

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査