

表 2058 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 透析前クレアチニン濃度 | 前希釈 | 後希釈 | 前・後希釈 | その他 | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------------|----|------|-------|
| 2未満(%) | 4 (21.1) | 15 (78.9) | | | 19 (100.0) | | 2 | 21 |
| 2～(%) | 12 (11.1) | 96 (88.9) | | | 108 (100.0) | | 20 | 128 |
| 4～(%) | 41 (11.1) | 329 (88.9) | | | 370 (100.0) | | 69 | 439 |
| 6～(%) | 79 (12.0) | 579 (87.9) | | 1 (0.2) | 659 (100.0) | | 128 | 787 |
| 8～(%) | 52 (11.0) | 421 (89.0) | | | 473 (100.0) | | 82 | 555 |
| 10～(%) | 18 (11.8) | 133 (87.5) | 1 (0.7) | | 152 (100.0) | | 26 | 178 |
| 12～(%) | 4 (20.0) | 15 (75.0) | 1 (5.0) | | 20 (100.0) | | 6 | 26 |
| 16～(%) | | | | | | | 1 | 1 |
| 合計(%) | 210 (11.7) | 1,588 (88.2) | 2 (0.1) | 1 (0.1) | 1,801 (100.0) | | 334 | 2,135 |
| 記載なし(%) | 4 (14.8) | 23 (85.2) | | | 27 (100.0) | | 23 | 50 |
| 総計(%) | 214 (11.7) | 1,611 (88.1) | 2 (0.1) | 1 (0.1) | 1,828 (100.0) | | 357 | 2,185 |
| 平均 | 9.16 | 9.16 | 14.30 | 9.50 | 9.17 | | 9.23 | 9.18 |
| 標準偏差 | 2.24 | 2.13 | 1.13 | | 2.14 | | 2.20 | 2.15 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査