

表 2112 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別（オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	10 (76.9)	2 (15.4)		1 (7.7)	13 (100.0)		1	14
0.4～ (%)	519 (94.4)	16 (2.9)		15 (2.7)	550 (100.0)		34	584
0.6～ (%)	4,421 (92.8)	197 (4.1)		148 (3.1)	4,766 (100.0)		288	5,054
0.8～ (%)	6,998 (92.4)	344 (4.5)		231 (3.1)	7,573 (100.0)	1	423	7,997
1.0～ (%)	2,702 (92.6)	111 (3.8)		105 (3.6)	2,918 (100.0)		164	3,082
1.2～ (%)	407 (90.4)	17 (3.8)		26 (5.8)	450 (100.0)		36	486
1.4～ (%)	36 (90.0)	3 (7.5)		1 (2.5)	40 (100.0)		2	42
1.6～ (%)	2 (66.7)	1 (33.3)			3 (100.0)			3
1.8～ (%)								
2.0～ (%)								
合計 (%)	15,095 (92.5)	691 (4.2)		527 (3.2)	16,313 (100.0)	1	948	17,262
記載なし (%)	773 (85.2)	39 (4.3)		95 (10.5)	907 (100.0)		82	989
総計 (%)	15,868 (92.1)	730 (4.2)		622 (3.6)	17,220 (100.0)	1	1,030	18,251
平均	0.87	0.87		0.88	0.87	0.87	0.87	0.87
標準偏差	0.16	0.16		0.17	0.16		0.16	0.16

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査