

表 2113 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別 (オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	8 (72.7)			3 (27.3)	11 (100.0)		2	13
0.4～ (%)	258 (91.2)	11 (3.9)		14 (4.9)	283 (100.0)		23	306
0.6～ (%)	2,075 (92.5)	104 (4.6)		64 (2.9)	2,243 (100.0)		145	2,388
0.8～ (%)	3,819 (91.8)	196 (4.7)		145 (3.5)	4,160 (100.0)		267	4,427
1.0～ (%)	2,049 (92.1)	110 (4.9)		65 (2.9)	2,224 (100.0)		134	2,358
1.2～ (%)	439 (93.8)	15 (3.2)		14 (3.0)	468 (100.0)		25	493
1.4～ (%)	54 (91.5)	2 (3.4)		3 (5.1)	59 (100.0)		5	64
1.6～ (%)	6 (100.0)				6 (100.0)			6
1.8～ (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
2.0～ (%)	3 (100.0)				3 (100.0)			3
合計 (%)	8,712 (92.1)	438 (4.6)		308 (3.3)	9,458 (100.0)		601	10,059
記載なし (%)	482 (83.8)	22 (3.8)		71 (12.3)	575 (100.0)		71	646
総計 (%)	9,194 (91.6)	460 (4.6)		379 (3.8)	10,033 (100.0)		672	10,705
平均	0.91	0.91		0.90	0.91		0.90	0.91
標準偏差	0.18	0.17		0.19	0.18		0.18	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査