

表 2114 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満(%)								
2～(%)	45 (90.0)	2 (4.0)		3 (6.0)	50 (100.0)		3	53
4～(%)	242 (89.0)	15 (5.5)		15 (5.5)	272 (100.0)		9	281
6～(%)	1,060 (90.8)	41 (3.5)		67 (5.7)	1,168 (100.0)		58	1,226
8～(%)	2,970 (91.9)	143 (4.4)		118 (3.7)	3,231 (100.0)	1	177	3,409
10～(%)	4,556 (92.8)	194 (4.0)		158 (3.2)	4,908 (100.0)		270	5,178
12～(%)	3,965 (92.7)	175 (4.1)		138 (3.2)	4,278 (100.0)		269	4,547
14～(%)	2,004 (93.3)	95 (4.4)		49 (2.3)	2,148 (100.0)		134	2,282
16～(%)	763 (93.5)	38 (4.7)		15 (1.8)	816 (100.0)		66	882
合計(%)	15,605 (92.5)	703 (4.2)		563 (3.3)	16,871 (100.0)	1	986	17,858
記載なし(%)	263 (75.4)	27 (7.7)		59 (16.9)	349 (100.0)		44	393
総計(%)	15,868 (92.1)	730 (4.2)		622 (3.6)	17,220 (100.0)	1	1,030	18,251
平均	11.51	11.53		10.86	11.49	9.00	11.77	11.51
標準偏差	2.66	2.74		2.67	2.67		2.69	2.67

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査