

表 3436 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 透析前リン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 インタクトPTH値160～180）

透析前リン濃度	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	3 (1.1)	2 (0.7)	3 (1.1)	20 (7.1)	4 (1.4)	78 (27.6)	91 (32.2)	41 (14.5)	5 (1.8)	18 (6.4)	9 (3.2)	3 (1.1)	4 (1.4)	2 (0.7)	283 (100.0)	5	288	9.19	0.88
3.0～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	6 (1.2)	44 (8.7)	7 (1.4)	163 (32.3)	162 (32.1)	78 (15.5)	5 (1.0)	21 (4.2)	15 (3.0)	1 (0.2)			504 (100.0)		504	9.09	0.61
3.5～ (%)	3 (0.3)	7 (0.7)	20 (2.0)	94 (9.2)	26 (2.6)	316 (31.1)	301 (29.6)	182 (17.9)	13 (1.3)	34 (3.3)	13 (1.3)	7 (0.7)	1 (0.1)		1,017 (100.0)	11	1,028	9.05	0.64
4.0～ (%)	4 (0.2)	6 (0.4)	28 (1.7)	118 (7.2)	48 (2.9)	493 (30.2)	522 (31.9)	253 (15.5)	34 (2.1)	76 (4.6)	42 (2.6)	8 (0.5)	1 (0.1)	2 (0.1)	1,635 (100.0)	19	1,654	9.10	0.66
4.5～ (%)	3 (0.2)	13 (0.7)	44 (2.3)	143 (7.4)	46 (2.4)	557 (28.7)	632 (32.6)	315 (16.3)	36 (1.9)	85 (4.4)	48 (2.5)	10 (0.5)	5 (0.3)	1 (0.1)	1,938 (100.0)	20	1,958	9.10	0.66
5.0～ (%)	2 (0.1)	6 (0.3)	44 (2.1)	173 (8.4)	49 (2.4)	621 (30.2)	626 (30.5)	331 (16.1)	48 (2.3)	101 (4.9)	36 (1.8)	10 (0.5)	7 (0.3)		2,054 (100.0)	19	2,073	9.09	0.64
5.5～ (%)	10 (0.6)	7 (0.4)	41 (2.3)	131 (7.4)	48 (2.7)	523 (29.5)	531 (30.0)	313 (17.7)	24 (1.4)	96 (5.4)	36 (2.0)	6 (0.3)	5 (0.3)		1,771 (100.0)	15	1,786	9.10	0.69
6.0～ (%)			6 (2.0)	33 (11.2)	14 (4.8)	83 (28.2)	95 (32.3)	42 (14.3)	4 (1.4)	9 (3.1)	6 (2.0)	2 (0.7)			294 (100.0)		294	9.04	0.60
6.1～ (%)	2 (0.2)	6 (0.6)	20 (2.1)	86 (8.9)	24 (2.5)	262 (27.2)	295 (30.6)	181 (18.8)	15 (1.6)	49 (5.1)	21 (2.2)	2 (0.2)		1 (0.1)	964 (100.0)	11	975	9.10	0.65
6.5～ (%)	3 (0.4)	6 (0.7)	26 (3.0)	97 (11.3)	24 (2.8)	239 (28.0)	234 (27.4)	144 (16.8)	15 (1.8)	40 (4.7)	13 (1.5)	11 (1.3)	2 (0.2)	1 (0.1)	855 (100.0)	7	862	9.06	0.74
7.0～ (%)	2 (0.4)	5 (1.1)	12 (2.5)	46 (9.7)	13 (2.7)	131 (27.5)	128 (26.9)	80 (16.8)	8 (1.7)	30 (6.3)	17 (3.6)	3 (0.6)	1 (0.2)		476 (100.0)	7	483	9.09	0.75
7.5～ (%)		2 (0.6)	11 (3.6)	32 (10.4)	13 (4.2)	99 (32.0)	80 (25.9)	51 (16.5)	6 (1.9)	10 (3.2)	3 (1.0)	1 (0.3)	1 (0.3)		309 (100.0)	5	314	8.99	0.64
8.0～ (%)	4 (2.5)	1 (0.6)	6 (3.7)	20 (12.3)	1 (0.6)	46 (28.4)	38 (23.5)	31 (19.1)	1 (0.6)	9 (5.6)	3 (1.9)		2 (1.2)		162 (100.0)	3	165	9.01	0.85
8.5～ (%)		1 (1.0)	1 (1.0)	9 (8.9)	3 (3.0)	28 (27.7)	33 (32.7)	18 (17.8)	1 (1.0)	4 (4.0)	2 (2.0)	1 (1.0)			101 (100.0)	1	102	9.11	0.62
9.0～ (%)	2 (1.1)	1 (0.6)	14 (8.0)	19 (10.9)	5 (2.9)	40 (23.0)	42 (24.1)	32 (18.4)	5 (2.9)	8 (4.6)	3 (1.7)	2 (1.1)	1 (0.6)		174 (100.0)	2	176	9.00	0.82
合計 (%)	39 (0.3)	64 (0.5)	282 (2.2)	1,065 (8.5)	325 (2.6)	3,679 (29.3)	3,810 (30.4)	2,092 (16.7)	220 (1.8)	590 (4.7)	267 (2.1)	67 (0.5)	30 (0.2)	7 (0.1)	12,537 (100.0)	125	12,662	9.09	0.68
記載なし (%)																19	19		
総計 (%)	39 (0.3)	64 (0.5)	282 (2.2)	1,065 (8.5)	325 (2.6)	3,679 (29.3)	3,810 (30.4)	2,092 (16.7)	220 (1.8)	590 (4.7)	267 (2.1)	67 (0.5)	30 (0.2)	7 (0.1)	12,537 (100.0)	144	12,681	9.09	0.68
平均	5.62	5.44	5.66	5.39	5.38	5.23	5.20	5.32	5.28	5.33	5.17	5.37	5.40	4.19	5.27	5.34	5.27		
標準偏差	1.76	1.45	1.62	1.38	1.27	1.32	1.30	1.33	1.35	1.35	1.33	1.71	1.61	1.95	1.34	1.44	1.34		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査