

表 2295 治療方法 併用の状況別（施設血液透析患者、糖尿病あり患者、透析回数週3回）

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	バイオフィルレーション	血液濾過	血液吸着透析 (リクセル)	血液吸着透析 (その他)	在宅血液透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	合計	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	106,992 (99.9)												106,992 (99.9)		106,992 (99.9)
PD単独 (%)															
HD(F)単独,PDカテ あり (%)	61 (0.1)												61 (0.1)		61 (0.1)
PD.HD併用週1 HD(F) (%)															
PD.HD併用週2 HD(F) (%)															
PD.HD併用週3 HD(F) (%)	11 (0.0)												11 (0.0)		11 (0.0)
PD.HD併用週4 HD(F) (%)															
PD.HD併用その他 (%)	1 (0.0)												1 (0.0)		1 (0.0)
合計 (%)	107,065 (100.0)												107,065 (100.0)		107,065 (100.0)
不明	4												4		4
記載なし															
総計	107,069												107,069		107,069

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査