

表 2296 治療方法 併用の状況別（血液透析濾過患者、糖尿病あり患者、透析回数週3回）

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	バイオフィルレーション	血液濾過	血液吸着透析 (リクセル)	血液吸着透析 (その他)	在宅血液透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	合計	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)		2,126 (100.0)	13,267 (99.9)	255 (100.0)	138 (99.3)								15,786 (99.9)		15,786 (99.9)
PD単独 (%)															
HD(F)単独,PDカテ あり (%)			6 (0.0)										6 (0.0)		6 (0.0)
PD.HD併用週1 HD(F) (%)															
PD.HD併用週2 HD(F) (%)															
PD.HD併用週3 HD(F) (%)							1 (0.7)						4 (0.0)		4 (0.0)
PD.HD併用週4 HD(F) (%)															
PD.HD併用その他 (%)															
合計 (%)		2,126 (100.0)	13,276 (100.0)	255 (100.0)	139 (100.0)								15,796 (100.0)		15,796 (100.0)
不明			1										1		1
記載なし															
総計		2,126	13,277	255	139								15,797		15,797

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査