

表 2297 治療方法(新分類)併用の状況別(血液透析濾過患者)

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイオファイルレーション	血液濾過	血液吸着透析 (リクセル)	血液吸着透析 (その他)	在宅血液透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	合計	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)		6,306 (99.9)	36,056 (99.9)	537 (100.0)	340 (99.7)								43,239 (99.9)		43,239 (99.9)
PD単独 (%)															
HD(F)単独,PDカテ あり (%)		4 (0.1)	18 (0.0)										22 (0.1)		22 (0.1)
PD.HD併用週1 HD(F) (%)															
PD.HD併用週2 HD(F) (%)		2 (0.0)	6 (0.0)										8 (0.0)		8 (0.0)
PD.HD併用週3 HD(F) (%)		2 (0.0)	7 (0.0)		1 (0.3)								10 (0.0)		10 (0.0)
PD.HD併用週4 HD(F) (%)															
PD.HD併用その他 (%)		1 (0.0)	1 (0.0)										2 (0.0)		2 (0.0)
合計 (%)		6,315 (100.0)	36,088 (100.0)	537 (100.0)	341 (100.0)								43,281 (100.0)		43,281 (100.0)
不明			2										2		2
記載なし															
総計		6,315	36,090	537	341								43,283		43,283

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査