

表 2298 治療方法(新分類)併用の状況別(オフラインHDF透析回数週3回)

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	バイオフィルレーション	血液濾過	血液吸着透析 (リクセル)	血液吸着透析 (その他)	在宅血液透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	合計	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)		5,823 (99.9)											5,823 (99.9)		5,823 (99.9)
PD単独 (%)															
HD(F)単独,PDカテ あり (%)			2 (0.0)										2 (0.0)		2 (0.0)
PD.HD併用週1 HD(F) (%)															
PD.HD併用週2 HD(F) (%)															
PD.HD併用週3 HD(F) (%)													2 (0.0)		2 (0.0)
PD.HD併用週4 HD(F) (%)															
PD.HD併用その他 (%)			1 (0.0)										1 (0.0)		1 (0.0)
合計 (%)		5,828 (100.0)											5,828 (100.0)		5,828 (100.0)
不明															
記載なし															
総計		5,828											5,828		5,828

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査