

表 2059 HDF希釈方法 体重減少量(kg)別（オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)		5 (100.0)			5 (100.0)		1	6
0.0～ (%)	17 (19.1)	72 (80.9)			89 (100.0)		18	107
1.0～ (%)	78 (17.3)	372 (82.5)		1 (0.2)	451 (100.0)		92	543
2.0～ (%)	136 (13.1)	899 (86.6)	1 (0.1)	2 (0.2)	1,038 (100.0)		208	1,246
3.0～ (%)	91 (12.8)	621 (87.1)	1 (0.1)		713 (100.0)		128	841
4.0～ (%)	23 (9.6)	215 (90.0)	1 (0.4)		239 (100.0)		35	274
5.0～ (%)	3 (7.9)	35 (92.1)			38 (100.0)		7	45
6.0～ (%)	2 (22.2)	7 (77.8)			9 (100.0)			9
7.0～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		1	3
8.0～ (%)		3 (100.0)			3 (100.0)			3
合計 (%)	350 (13.5)	2,231 (86.2)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,587 (100.0)		490	3,077
記載なし (%)	1 (2.6)	37 (97.4)			38 (100.0)		20	58
総計 (%)	351 (13.4)	2,268 (86.4)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,625 (100.0)		510	3,135
平均	2.57	2.76	3.27	2.27	2.73		2.65	2.72
標準偏差	1.06	1.19	0.80	0.40	1.17		1.00	1.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査