

表 2060 HDF希釈方法 体重減少量(kg)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)		4 (100.0)			4 (100.0)		2	6
0.0～ (%)	16 (17.2)	77 (82.8)			93 (100.0)		27	120
1.0～ (%)	73 (12.9)	494 (87.1)			567 (100.0)		96	663
2.0～ (%)	97 (11.1)	775 (88.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	874 (100.0)		157	1,031
3.0～ (%)	22 (9.4)	211 (90.2)	1 (0.4)		234 (100.0)		51	285
4.0～ (%)	1 (4.8)	20 (95.2)			21 (100.0)		4	25
5.0～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		1	3
6.0～ (%)								
7.0～ (%)								
8.0～ (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
合計 (%)	209 (11.6)	1,584 (88.2)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,796 (100.0)		338	2,134
記載なし (%)	5 (15.6)	27 (84.4)			32 (100.0)		19	51
総計 (%)	214 (11.7)	1,611 (88.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,828 (100.0)		357	2,185
平均	2.06	2.19	3.00	2.70	2.18		2.17	2.18
標準偏差	0.72	0.81	0.14		0.80		0.86	0.81

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査