

表 2062 HDF希釈方法 体重減少率(%)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	3 (10.0)	27 (90.0)			30 (100.0)		12	42
1.0～ (%)	6 (12.2)	43 (87.8)			49 (100.0)		15	64
2.0～ (%)	26 (16.0)	137 (84.0)			163 (100.0)		26	189
3.0～ (%)	50 (14.0)	306 (86.0)			356 (100.0)		62	418
4.0～ (%)	55 (11.7)	416 (88.3)			471 (100.0)		80	551
5.0～ (%)	37 (9.1)	367 (90.4)	2 (0.5)		406 (100.0)		74	480
6.0～ (%)	23 (11.4)	178 (88.1)		1 (0.5)	202 (100.0)		44	246
7.0～ (%)	9 (12.3)	64 (87.7)			73 (100.0)		15	88
8.0～ (%)		33 (100.0)			33 (100.0)		6	39
9.0～ (%)		12 (100.0)			12 (100.0)		4	16
合計 (%)	209 (11.6)	1,583 (88.2)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,795 (100.0)		338	2,133
記載なし (%)	5 (15.2)	28 (84.8)			33 (100.0)		19	52
総計 (%)	214 (11.7)	1,611 (88.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,828 (100.0)		357	2,185
平均	4.44	4.69	5.43	6.54	4.66		4.62	4.65
標準偏差	1.47	1.61	0.12		1.60		1.82	1.64

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査