

表 2063 HDF希釈方法 透析前BUN(mg/dL)別（オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満		4			4			4
(%)		(100.0)			(100.0)			
20～	8	23			31		9	40
(%)	(25.8)	(74.2)			(100.0)			
30～	9	105			114		27	141
(%)	(7.9)	(92.1)			(100.0)			
40～	44	309			353		66	419
(%)	(12.5)	(87.5)			(100.0)			
50～	92	566	1	2	661		115	776
(%)	(13.9)	(85.6)	(0.2)	(0.3)	(100.0)			
60～	96	576	1		673		117	790
(%)	(14.3)	(85.6)	(0.1)		(100.0)			
70～	53	375		1	429		109	538
(%)	(12.4)	(87.4)		(0.2)	(100.0)			
80～	25	172			197		36	233
(%)	(12.7)	(87.3)			(100.0)			
90～	19	78	1		98		7	105
(%)	(19.4)	(79.6)	(1.0)		(100.0)			
100～	3	15			18		4	22
(%)	(16.7)	(83.3)			(100.0)			
110～		3			3			3
(%)		(100.0)			(100.0)			
120～		2			2			2
(%)		(100.0)			(100.0)			
合計	349	2,228	3	3	2,583		490	3,073
(%)	(13.5)	(86.3)	(0.1)	(0.1)	(100.0)			
記載なし	2	40			42		20	62
(%)	(4.8)	(95.2)			(100.0)			
総計	351	2,268	3	3	2,625		510	3,135
(%)	(13.4)	(86.4)	(0.1)	(0.1)	(100.0)			
平均	62.70	61.89	72.33	60.67	62.01		61.36	61.90
標準偏差	15.41	15.20	21.22	9.87	15.23		14.79	15.16

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査